国家基准药物实用手册（五）

闫新 编著

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　　录

血液制品.....1
破伤风免疫球蛋白.....1
人胎盘丙种球蛋白.....2
人血丙种球蛋白.....2
乙型肝炎免疫球蛋白.....3
催眠药.....4
苯巴比妥.....4
异戊巴比妥.....5
异戊巴比妥.....6
白内停.....6
地塞米松.....7
可的松.....8
硫酸锌.....8
氯化氨基汞.....9
氢化可的松.....9
色甘酸钠.....10
妥拉唑啉（妥拉苏林）.....10
抗情感障碍药.....11
阿米替林.....11
多塞平.....12
氯米帕明.....13
马普替林.....15
咪色林.....16
米帕明.....17
哌醋甲酯.....18
匹莫林.....19

碳酸锂 21
抗焦虑药 22
阿普唑呛 22
艾司唑仑 23
奥沙西泮 24
地西泮 25
氟西泮 27
劳拉西泮 28
氯硝西泮 29
羟嗪 30
三唑仑 31
硝西泮 32
抗精神病药 33
奋乃静 33
氟奋乃静啶 34
氟奋乃静癸酸酯 35
长效抗精神药 36
氟哌啶醇 36
氟哌啶醇癸酸酯 37
硫利达嗪 38
氯丙嗪 39
氯氮平 41
氯普噻吨 42
氯噻吨癸酸酯 43
哌泊塞嗪棕榈酸酯 44
三氟拉嗪 45
舒必利 46
五氟利多 47

氟哌啶醇癸酸酯 48
氯噻吨癸酸酯 49
哌泊塞嗪棕榈酸酯 50
五氟利多 51
氨基酸类肠内及肠外营养病 52
谷胱甘肽 52
精氨酸 53
静脉注射复方氨基酸 53
静脉注射复方氨基酸（14S） 54
静脉注射复方氨基酸（15HBC） 55
静脉注射复方氨基酸（17） 56
静脉注射复方氨基酸（18F） 56
静脉注射复方氨基酸（3H） 57
静脉注射复方氨基酸（小儿输液用） 58
静脉注射复方肾病用氨基酸 59
维生素类肠内及肠外营养病 59
复方维生素 B 59
复方维生素 B 60
干酵母 60
骨化三醇 61
甲萘氢醌 62
静脉多种维生素（水乐维他） 62
维生素 A 63
维生素 AD 64
维生素 B1 65
维生素 B12 65
维生素 B2 67
维生素 D3 67

维生素 E 68
腺苷钴胺 68
亚硫酸氢钠甲萘醌 69
烟酰胺 70
肠内营养制剂 71
肠内营养剂（爱伦多） 71
肠内营养剂（商品名：氨素） 72
肠内营养剂（商品名：维多粉） 73
脂肪乳类 73
脂肪乳（长、中长链） 73
局部耳鼻喉治疗及其他药 74
玻璃酸酶 74
地芬尼多 75
复方硼砂漱口片 76
鱼肝油 76
鱼肝油酸钠 77
抗感染用药 78
度米芬 78
克霉唑 79
氯己啶 80
溶菌酶 80
氧氟沙星 81
抗组胺药 82
阿司咪唑 82
苯海拉明 83
苯海拉明 84
茶苯海明 85
氯苯那敏 86

需要全本请访问 www.ertongbook.com

氯雷他定 86
马来那敏 87
曲吡那敏 88
去氯羟嗪 89
赛庚啶 89
特非那定 90
西替利嗪 91
异丙嗪 92
消毒防腐药 93
苯扎溴铵 93
碘酊 94
度米芬 95
高锰酸钾 95
过氧化氢溶液 96
过氧乙酸 97
含氯石灰 98
甲醛溶液 99
氯己定 100
硼酸 101
戊二醛 102
依沙吖啶 103
乙醇 103
肿瘤类药 104
丙卡巴肼 104
达卡巴嗪 106
恩丹西酮 107
干扰素 107
环胞菌素 A 108

卡铂 108
美司钠 109
米托蒽醌 109
顺铂 110
香菇多糖 111
亚叶酸外 112
左旋门冬酰氨酶 113
抗代谢药 114
阿糖胞苷 114
氟尿嘧啶 115
甲氨蝶呤 116
羟基脲 117
巯嘌呤 118
替加氟 119
抗肿瘤抗生素 121
阿克拉霉素 A 121
阿霉素 122
放线菌素 D 123
平阳霉素 124
柔红霉素 125
丝裂霉素 126
抗肿瘤植物药 127
长春碱 127
长春新碱（醛基长春碱） 128
高三尖杉酯碱 129
羟喜树碱 130
替尼泊甙 130
依托泊甙 131

抗肿瘤激素类药 133
氨鲁米特 133
甲羟孕酮醋酸酯 134
他莫昔芬 134
烷化剂 135
白消安 135
苯丁酸氮芥 137
氮芥 137
甘磷酰芥 138
环磷酰胺 139
甲酰溶肉瘤素 140
卡莫司汀 141
六甲嘧胺 142
洛莫司汀 143
美法仑 143
塞替哌 144
司莫司汀 145
消卡芥 146
异环磷酰胺 147

血液制品

破伤风免疫球蛋白

药剂名称：破伤风免疫球蛋白

别名：人抗破伤风免疫球蛋白、TetanusImmunoglobulin

性状：为无色或淡黄色澄明液体

药理和应用：

本品系用破伤风类毒素免疫健康人，待血中抗体达一定水平时，自血浆分离提纯而制得的免疫球蛋白制剂，用于破伤风的被动免疫。含有抗破伤风外毒素的抗体，可中和血中游离毒素和伤口中细菌繁殖所产生的毒素，但对已与神经组织结合的毒素无作用。临床用于预防破伤风和减轻病程。适用于免疫史不清与血清过敏，伤口感染 24 小时以上以及接种破伤风类毒素仍无免疫力的破伤风患者，可同时或 1 个月后注射破伤风类毒素。

用法和用量：

肌注：预防，250～500U（伤 24 小时以上或伤口严重感染者可用至 500U）。治疗，剂量为 3000U，分 3 等分肌注入三个不同部位。

不良反应和注意：

用后肌注处可有疼痛、硬结、红斑等反应，过敏反应罕见。对丙种球蛋白过敏禁用。同时注射破伤风类毒素时，不得使用同一注射器或注射于同一部位。本品严

禁静注。

制剂和规格：注射液：100U/2ml（每 100ml 含蛋白 10～18g，其中球蛋白不少于 90%）。

人胎盘丙种球蛋白

药剂名称：人胎盘丙种球蛋白

别名：HumanPlacentalImmunoglobulin

性状：为淡黄色或淡棕色澄明液体，微带乳光。

药理和应用：本品是由人胎盘血提制的一种免疫球蛋白制剂。其作用和用途与人血丙种球蛋白相同。主要用于对传染性肝炎、麻疹及其他病毒性疾病的预防。只是含量较低，用量较大。

用法和用量：肌注：儿童每次 0.2～0.8ml/kg，成人每次 6～9ml。

不良反应和注意：不良反应与人血丙种球蛋白相同，但对"O"型血的孕妇应用要特点慎重，因本品常含有少量 A 或 B 血型物质，进入母体后产生的抗体可通过胎盘进入胎儿，导致新生儿溶血。

制剂和规格：注射液：0.135mg/3ml

人血丙种球蛋白

药剂名称：人血丙种球蛋白

别名：HumanNormalImmunoglobulin

性状：为几乎无色或淡黄色澄明液体，微带乳光。

药理和应用：

本品为人血浆提制的一种免疫球蛋白制剂。临床用

于预防甲型肝炎和麻疹等病毒性疾病，或减轻其病还必须。也用于脊髓灰白质炎、腮腺炎、水痘等的预防或减轻病情。对某些感染性疾病本品也有缓解的作用，另本品也用于丙种球蛋白缺乏症。

用法和用量：

肌注：用于预防肝炎和麻疹，5 岁以下每次 1.5～3ml，6 岁以上每次 3ml，最大剂量是不超过 6ml。每次注射后预防效果可维持 4～6 周。

不良反应和注意：

用后少数患者注射部位可有疼痛，以至头痛、发冷、恶心等过敏反应。1 岁以下婴儿尽量少用；否则会抑制自身地免疫球蛋白的合成。

制剂和规格：注射剂：0.3g/3ml

乙型肝炎免疫球蛋白

药剂名称：乙型肝炎免疫球蛋白

别名：乙肝免疫球蛋白、HepatitsBImmunoglobulin

性状：为无色微带乳光或淡黄色澄明液体。

药理和应用：

本品主要用于预防病毒性乙型肝炎，注射后被动免疫可持续 3 个月。用于意外接种的预防，如乙肝病毒通过针刺，吸入或溅入粘膜等意外暴露事故，可防止发病，延长潜伏期或减轻症状。亦用于阻断乙型肝炎的母婴传播（垂直传播），生后注射愈早效果愈好，可免除或推迟新生儿感染乙型肝炎。也可用于与急性乙型肝炎病人接触密切者的预防感染。

用法和用量：

需要全本请访问 www.ertongbook.com

肌注：每次 1ml，母亲患乙型肝炎或乙肝表面抗原特别是e抗原阳性的新生儿，应在出生后24小时内注射，每次 1ml，免疫间隔为零月（注射法时），1 月及 6 月（第 1 针后第 6 月）共 3 针。

不良反应和注意：本品一般无不良反应。急性传染病及发烧者不能注射。

制剂和规格：注射液：1ml/支

催眠药

苯巴比妥

药剂名称：苯巴比妥

别名：鲁米那、Phenobarbital、Luminal

性状：

为白色有光泽的结晶性粉末，无臭，味微苦。可溶于乙醚或乙醇，略溶于氯仿，极微溶于水。

药理和应用：

为巴比妥类长效镇静催眠药。它被认为能直接阻断脑干网状结构上行激活系统，使大脑皮层细胞产生抑制过程。具有较强的镇静、催眠、抗惊厥及抗癫痫作用。临床可用于失眠、焦虑、烦躁、高血压、甲亢、高热和破伤风及脑炎引起的惊厥等。也用于麻醉前给药。

用法和用量：

口服：一般每次 15-30mg，每日 3 次。用于㑊催眠前服 60mg。肌注：一般每次 100-200mg，极量每日 500mg。

（注射用是按钠盐计算）

不良反应和注意：

可有嗜睡、头晕、乏力、皮疹、发热、关节肌肉痉痛等不良反应。久用可产生耐受笥和依赖性。多次过量连用可蓄积中毒。肝、肾、肺功能不合者慎用。严重肺功能不全及支气管哮喘患者禁用。

配伍禁忌：

注射剂不可与酸性药物配伍。本品有酶促作用，可加速洋地黄毒甙，地高辛等代谢，使其作用减弱。

制剂和规格：片剂：30mg/片，100mg/片。注射剂：50mg/瓶，100mg/瓶（钠盐）。

异戊巴比妥

药剂名称：异戊巴比妥

别名：速可眠、速可巴比妥、Secobarbital、Sconal

性状：

为白色粉末，无臭，味苦。有吸湿性。极易溶于水，乙醇；难溶于乙醚和氯仿。水溶液不稳定，放置中渐渐分解。

药理和应用：

为短效巴比妥类催眠药，催眠作用出现快，服药后15～20 分钟即入睡，持续时间亦短。临床用于不易入睡的病人。也可用于紧张、焦虑不安、过度兴奋、麻醉前和术前的镇静及脑电图检查的睡眠诱发试验。

用法和用量：

口服：镇静，每次 50mg，每日 3 次。催眠，100～200mg，睡前服。麻醉前给药，每次 200～300mg，术前 1～

2 小时服。

体内过程：

口服 15～20 分钟发生作用，维持 6～8 小时。T1/2 为 19～34 小时。主要在肝脏代谢，经肾脏排泄。

不良反应和注意：

连续应用易产生耐受性，应用 1～2 周催眠作用明显减低。久用可产生依赖性。

制剂和规格：胶囊剂：100mg/粒。

异戊巴比妥

药剂名称：异戊巴比妥

别名：阿米妥、Amobarbital

性状：为白色结晶性粉末，无臭，味苦。易溶于乙醇或乙醚，可溶于氯仿。极微溶于水。

药理和应用：

巴比妥类中效催眠药。有着较好的镇静催眠、抗惊厥作用。临床可用于失眠、焦虑、烦躁及多种原因引起的惊厥等。其注射剂主要用于抗惊厥。

用法和用量：肌注或缓慢静注：每次 250mg，极量每次 500mg，每日 1g（均按钠盐计算）。

不良反应和注意：久用可产生耐受性和依赖性。肝功严重不全者禁用。

制剂和规格：注射剂：250mg/瓶（钠盐）。

白内停

药剂名称：白内停

别名：卡他林眼药水、BernetinumNatricum、Catalin，OphthalmieSolution

性状：

本品能抑制芳香氨基酸异常代谢生成的酯类物质，防止晶体内不溶性蛋白质的形成，抑制白内障病等的发展。

药理和应用：

临床适用于初期老年性白内障。也用于防止老年性白内障和糖尿病引起的白内障恶化、外伤性和先天性白内障以及色素性视网膜炎等。

用法和用量：取一片卡他林溶于 15ml 的溶剂中，滴眼：每次 1～2 滴，每日 3～5 次

不良反应和注意：

用后偶可有弥漫性表层角膜炎、眼睑缘炎、结膜充血、刺激感、瘙痒等。如出现以上症状应停止应用。

地塞米松

药剂名称：地塞米松

别名：Dexamethasone

性状：地塞米松滴眼剂，内含磷酸地塞米松 0.1%，为肾上腺皮质激素类眼科用药。

药理和应用：

可用于眼部过敏性疾病及各种非化脓性炎症。因本品渗透性较强，故尤适用于虹膜、睫状体等炎症。

不良反应和注意：

如用于感染性炎症，必须与抗菌药合用。不可长期使用，因可致青光眼和白内障。

可的松

药剂名称：可的松

别名：Cortisone

性状：

可的松滴眼剂，为每 ml 内含醋酸可的松 5mg，吐温-800.8mg，硼酸 20mg，硝酸苯汞 0.02mg，羟甲基纤维素钠 2mg 的澄明水溶液。其眼膏为每 g 内含醋酸可的松 2.5mg～10mg 的膏剂。

药理和应用：

可的松局部用于眼科具有抑制炎性反应，组织敏感及上皮生长等作用。临床可用于角膜炎、巩膜炎、虹膜炎、疮疹性眼炎，交感性眼炎及白内障术后等。

不良反应和注意：树枝状角膜炎患者慎用。

硫酸锌

药剂名称：硫酸锌

别名：ZincSulfate

性状：内含硫酸锌 0.25%和硼酸 2%硫酸锌滴眼剂，有收敛作用

药理和应用：临床可用于治疗慢性结膜炎及眦部睑缘炎等

用法和用量：滴眼：每日 3～4 次

氯化氨基汞

药剂名称：氯化氨基汞

别名：白降汞、AminomercuricChloride、HA

性状：

为白色或类白色粉末或易碎的块状，无臭，遇光易分解。不溶于水、醇、醚，易溶于热稀酸。

药理和应用：

本品与组织接触后，则逐渐游离出微量的汞离子，而发挥长时间的抑菌作用，对组织刺激作用却很低。其每 g 内含本品 20mg 的眼膏。可用于睑缘炎、深层角膜炎和巩膜炎等。

用法和用量：涂眼：每日 2～3 次。

制剂和规格：2g/支

氢化可的松

药剂名称：氢化可的松

别名：Hydrocortisone

性状：氢化可的松眼膏内含 0.5%的醋酸氢化可的松。

药理和应用：

临床可用于眼部过敏及各种非化脓性炎症。因本品渗透性较差，故较适用于外眼病，如眼睑、结膜、角膜炎等。

不良反应和注意：不宜长期使用

需要全本请访问 www.ertongbook.com