

中华医学全集

国家中药标准全书 (三)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

**中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004**

ISBN 7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD, 含配套书)

目 录

◎益心酮片.....	1
◎益虚宁片.....	5
◎益血膏.....	7
◎益血生胶囊.....	11
◎阴起石.....	17
◎阴虚胃痛颗粒.....	19
◎阴虚胃痛片.....	21
◎茵白肝炎冲剂.....	23
◎茵陈酒.....	26
◎茵陈五疸丸.....	29
◎茵陈五苓糖浆.....	31
◎茵陈五苓丸.....	34
◎茵胆平肝胶囊.....	35
◎茵莲清肝合剂.....	37

◎茵山莲颗粒(无糖型).....	40
◎茵栀黄口服液.....	42
◎茵栀黄注射液.....	49
◎银柴合剂.....	52
◎银柴颗粒.....	54
◎银耳孢糖胶囊.....	56
◎银花感冒冲剂.....	61
◎银花抗感片.....	63
◎银花糖浆.....	65
◎银黄冲剂.....	67
◎银黄含化片.....	70
◎银黄胶囊.....	72
◎银黄片.....	75
◎银黄注射液.....	77
◎银菊感冒片.....	82
◎银菊清解片.....	84
◎银密片.....	88

◎银翘袋泡剂.....	90
◎银翘解毒合剂.....	93
◎银翘解毒颗粒(冲剂).....	97
◎银翘解毒丸(蜜丸).....	100
◎银翘解毒丸(浓缩丸).....	106
◎银翘解毒液.....	109
◎银翘散.....	113
◎银翘伤风胶囊.....	115
◎银屑冲剂.....	119
◎银屑灵.....	121
◎银杏露.....	123
◎引阳索.....	124
◎婴儿安片.....	127
◎婴儿保肺宁(散).....	129
◎婴儿保肺宁胶囊.....	130
◎婴儿平(胶囊)[剧]	132
◎婴儿平(散).....	134

◎ 婴儿散胶囊.....	136
◎ 婴儿素.....	137
◎ 婴儿消食散.....	141
◎ 婴宁散.....	143
◎ 樱桃核.....	146
◎ 营心丹.....	148
◎ 映山红糖浆.....	152
◎ 永盛合阿胶.....	156
◎ 优福宁胶囊.....	159
◎ 油松节.....	161
◎ 右归丸.....	164
◎ 幼泻宁冲剂.....	166
◎ 瘀血痹胶囊.....	168
◎ 瘀血痹颗粒.....	171
◎ 余甘子喉片.....	174
◎ 鱼鳔补肾丸.....	175
◎ 鱼鳔丸.....	178

◎鱼金注射液.....	181
◎鱼鳞病片.....	185
◎鱼脑石.....	188
◎鱼腥草注射液.....	190
◎黄连片.....	194

◎益心酮片

拼音名：Yixingtong Pian

标准编号：WS3-B-1218

来源/ 处方：本品为山楂叶总黄酮制成的片。

【制法】

取山楂叶总黄酮32g，淀粉32g，糊精25g，蔗糖5g，混匀，制成颗粒60℃以下干燥。

加入滑石粉5g，硬脂酸镁1g，混匀，压制成1000片，包糖衣，即得。

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后，显棕黄色；气特异，味略苦。

【鉴别】

取本品，除去糖衣后，研细，称取0.1g，加甲醇50ml，振摇数分钟，滤过，滤液照下述方法试验：

(1)取滤液2ml，置试管中，加三氯化铝甲醇液

(0.1mol/L)2ml, 振摇后, 溶液显鲜黄色。

(2)取滤液 2ml, 置试管中, 加少量锌粉, 滴加盐酸 6~10滴, 1~2 分钟后显红色。

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定(附录11页)。

【功能与主治】

活血化瘀, 宣通心脉, 理气舒络。

用于胸闷憋气, 心悸健忘, 眩晕耳鸣及冠心病心绞痛, 高血脂症, 脑动脉供血足。

【用法与用量】

口服, 一次2~3片, 一日3次。

【贮藏】

密封, 避光, 置阴凉干燥处。

附: 山楂叶总黄酮的制法及质理标准。

【制法】

取山楂叶, 粉碎成粗粉, 照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录 17 页), 以乙醇为溶剂, 进行渗漉,

收集渗漉液，减压回收醋酸乙酯，加等量水稀释后，加入石油醚除去叶绿素，分出水层，用醋酸乙酯提取，减压回收醋酸乙酯，并浓缩至干即得。

【性状】

本品为浅棕色至棕黄色的粉末；气特异，味苦。
具引湿性。

【鉴别】

(1)取本品适量，溶于 2ml 甲醇中，加入三氯化铝甲醇液(0.1mol/L)2ml，振摇后，溶液显鲜黄色。

(2)取本品少许，溶于 2ml 甲醇中，加入少量锌粉及盐酸 6~10 滴，1~2 分钟后即显红色。

【检查】

干燥失重 取本品约 1g，精密称定，平铺于称量瓶中，置硫酸干燥器中干燥 24 小时，减失重量应不超过 2%。

【含量测定】

对照品溶液的制备

精密称取在120℃减压干燥至恒重的芦丁对照品60mg，置100ml量瓶中，加乙醇适量使溶解，加乙醇稀释至刻度，摇匀。

精密量取5ml，置50ml量瓶中，加乙醇稀释至刻度，摇匀，即得(每1ml中含无芦丁60μg)。

标准曲线的制备

精密量取对照品溶液0.5、1.0、2.0、3.0、4.0与5.0ml，分别置25ml比色管中，各加乙醇稀释至5ml，精密加三氯化铝液(0.1mol/L)3ml及醋酸钾液(1mol/L)5ml，摇匀，放置40分钟，照分光光度法(附录51页)，在415nm的波长处测定吸收度，随行试剂作空白，以吸收度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

测定法 取本品约0.25g，精密称定，置50ml量瓶中，加50%乙醇溶解并稀释至刻度，摇匀。

精密量取2ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀。

精密量取 5ml，置25ml比色管中，照标准曲线制备项下的方法，自“精密加入三氯化铝液”起依法测定吸收度，从标准曲线上读出供试品溶液中芦丁的重量(μg)，计算，即得。

本品含山楂叶总黄酮以无水芦丁 ($\text{C}_{27}\text{H}_{30}\text{O}_{16}$)计，应不得少于10%。

◎益虚宁片

拼音名：Yixuning Pian

标准编号：WS3-B-1005

【处方】

枸杞子 150g 何首乌(黑豆汁制)150g 党参 150g 当归 100g 地黄 100g 五味子 100g 菟丝子 100g 女贞子 50g 牛膝 50g 牡丹皮 50g 麦冬 50g 甘草 25g

【制法】

以上十二味，何首乌、当归、牡丹皮及地黄 50g

粉碎成细粉，过筛；其余地黄及枸杞子等八味加水煎煮三次，第一次2小时，第二、三次各1小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度1.30~1.40的清膏，加入何首乌等粉末，混匀，在80℃左右烘干，制成颗粒，压制成片，包糖衣，即得。

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后显深棕色；味甜。

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定(附录11页)。

【功能与主治】

养阴益气，补血安神。

用于失眠少寐、头发脱落，耳鸣头晕，腰痛腿软。

【用法与用量】

口服，一次5~6片，一日3次。

【规格】

每片0.35g

【贮藏】

密封。

◎益血膏

拼音名：Yixue Gao

标准编号：WS3-B-1219

【处方】

黄芪 124.1g 当归 99.3g 川芎 82.7g 益母
草 248.3g 菟丝子 82.7g 大黄 24g 木香 24.9g
白芍 124.1g 地黄 124.1g 何首乌(黑豆酒炙)
82.7g 枸杞子 82.7g

【制法】

以上十一味，当归、川芎、木香提取挥发油，蒸馏后的水溶液另器收集药渣与其余黄芪等八味，加水煎煮二次，第一次 3 小时，第二次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液与上述水溶液合并，浓缩至相对密度 1.35～1.40 (50℃) 的清膏。

每 100g 清膏加炼蜜 100g，混匀，放冷，加入当归

等挥发油，混匀，即得。

【性状】

本品为黑褐色稠厚的半流体；味甜、微苦而涩。

【鉴别】

(1)取本品10g，加 0.5%盐酸乙醇溶液10ml，温热使溶解，趁热滤过，滤液加氨试液调至中性，蒸干，残渣加稀硫酸 5ml使溶解，滤过，取滤液 1ml，加硅钨酸试液 1~2 滴，即生成棕黄色沉淀。

(2)取本品20g，加水10ml，搅拌溶解，转至分液漏斗中，加以饱和的正丁醇提取二次，每次30ml，合并正丁醇提取液，用以正丁醇饱和的水洗涤二次，每次10ml，弃去水液，正丁醇液置水浴上浓缩至约1ml，加适量中性氧化铝的在水浴上拌匀干燥，装入预先装填好的中性氧化铝小柱(中性氧化铝2.5g, 内径约0.9cm)顶部，以醋酸乙酯-甲醇(1:1)40ml 分次洗脱；收集洗脱液，蒸干，残渣加乙醇 1ml使溶解，作为供试品溶液。

另取芍药甙对照品，加乙醇制成每 1ml 含 2mg 的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上以氯仿-醋酸乙酯-甲醇-甲酸 (40:5:10:0.2) 为展开剂，展开，取出，晾干，喷以%香草醛硫酸溶液，热风吹至斑点显色清晰。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显同颜色的斑点。

(3)取鉴别(2)项下中性氧化铝小柱，再用40%距分次洗脱，收集洗脱液，置水浴上蒸干，残渣加甲醇 1ml使溶解，作为供试品溶液。

另取黄芪甲甙对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-甲醇-水(65:35:10)的下层溶液为展开剂，展开，取出，

晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在 105℃烘约 5分钟供试品色谱中，在与对照色谱法相应的位置，显相同的棕褐色斑点；再置紫外光灯(365nm)下检视，显相同的橙黄色荧光斑点。

【检查】

相对密度 应为0.43~1.47(附录34页)。

其他 应符合煎膏剂项下有关的各项规定(附录13页)。

【功能与主治】

益精血，补肝肾。

用于气虚血亏引起的面色萎黄，精神倦怠，头晕目眩。

妇女血虚，月经不调，血小板减少，血色素降低。

【用法与用量】

口服，一次10~20g，一日 3次。

【规格】

每瓶装100g