

中华医学全集

国家中药标准全书 (三十八)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004

ISBN 7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD, 含配套书)

目 录

◎明睛地黄丸.....	1
◎明目拨云散.....	2
◎明目地黄丸(浓缩丸).....	5
◎明目蒺藜丸.....	8
◎明目上清片.....	10
◎明目上清丸.....	13
◎明目羊肝丸.....	14
◎摩罗丹.....	17
◎磨积散.....	20
◎母乳多颗粒.....	22
◎牡荆片.....	25
◎牡荆油滴丸.....	26
◎木耳.....	29
◎木耳舒筋丸.....	30

◎木芙蓉花.....	33
◎木芙蓉叶.....	34
◎木瓜酒.....	36
◎木瓜片.....	38
◎木瓜丸(大蜜丸).....	40
◎木槿花.....	42
◎木槿皮(川槿皮).....	44
◎木香分气丸.....	47
◎木香理气片.....	50
◎木香顺气丸.....	53
◎内补养荣丸.....	55
◎内消瘰疬片.....	57
◎内消瘰疬丸.....	59
◎男宝胶囊.....	62
◎男康片.....	64
◎南板蓝根.....	68
◎南板蓝根冲剂.....	70

◎南寒水石.....	72
◎南山楂.....	74
◎囊虫丸〔剧〕	75
◎硃砂膏.....	77
◎蛲虫药膏.....	80
◎脑得生片.....	82
◎脑得生丸.....	84
◎脑乐静.....	89
◎脑力宝丸.....	92
◎脑力静糖浆.....	98
◎脑立清胶囊.....	102
◎脑立清片.....	104
◎脑立清丸.....	107
◎脑灵片.....	110
◎脑灵素胶囊.....	112
◎脑灵素片.....	114
◎脑络通胶囊.....	117

◎脑塞通丸.....	124
◎脑血栓片.....	127
◎脑震宁颗粒.....	130
◎尿感宁冲剂.....	134
◎宁坤丸.....	135
◎宁坤养血丸.....	139
◎宁神定志丸.....	141
◎宁神灵冲剂.....	143
◎宁神丸.....	145
◎宁嗽露(糖浆剂).....	147
◎宁嗽丸.....	148
◎宁心安神胶囊.....	151
◎宁心宝胶囊.....	154
◎宁心补肾丸.....	156
◎牛黄安心丸.....	158
◎牛黄八宝丸.....	160
◎牛黄抱龙片.....	162

◎牛黄化毒片.....	164
◎牛黄降压胶囊.....	166
◎牛黄解毒丸(水丸).....	169
◎牛黄净脑片.....	172
◎牛黄宁宫片.....	175
◎牛黄噙化丸.....	180
◎牛黄清肺散.....	183
◎牛黄清宫丸.....	185
◎牛黄清火丸.....	187
◎牛黄清脑丸.....	190
◎牛黄清热胶囊.....	192

◎明睛地黄丸

拼音名：Mingjing Dihuang Wan

标准编号：WS3-B-2348

【处方】

地黄 272g 熟地黄 272g 防风 68g 牛膝
51g 苦杏仁 68g 枳壳 68g 石斛 68g

【制法】

以上七味，粉碎成细粉，过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜80～90g，制成大蜜丸，即得。

【性状】

本品为黑褐色的大蜜丸；气微香，味甜、微苦。

【鉴别】

取本品，置显微镜下观察：薄壁组织灰棕色至黑棕色，细胞多皱缩，内含棕色核状物。

油管含金黄色分泌物，直径约30μm。

草酸钙方晶成片，存在于薄壁细胞中。

纤维无色或淡黄色，周围细小类圆形细胞中含有圆簇状硅质块，直径6~11μm，排列成行。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】

滋肾养肝，明目。

用于肝肾阴虚，目涩怕光，迎风流泪。

【用法与用量】

口服，一次1丸，一日2~3次。

【规格】

每丸重6g

【贮藏】

密封。

◎明目拨云散

拼音名：Minmu Boyun San

标准编号：WS3-B-2347

【处方】

炉甘石(煅，水飞) 120g 黄连 30g 琥珀
4.5g 珍珠(豆腐炙) 3g 冰片 4.5g

【制法】

以上五味，珍珠水飞或粉碎成极细粉，琥珀、冰片、炉甘石分别研成最细粉；黄连加水煎煮三次，滤过，滤液浓缩，加入炉甘石粉末搅匀，干燥，研细，过筛，与上述珍珠等三味细粉配研均匀，过筛，即得。

【性状】

本品为淡黄色的粉末；气香。

【鉴别】

(1)取本品3g，加乙醇10ml，超声处理5分钟，滤过，滤液浓缩至1ml，作为供试品溶液。

另取盐酸小檗碱对照品，加乙醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法试验，吸取上述两种溶液各3 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇－冰醋酸－

水(7: 1: 2)为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中, 在与对照品色谱相应的位置上, 显相同颜色的荧光斑点。

(2)取〔鉴别〕(1)项下的供试品溶液, 作为供试品溶液。

另取冰片对照品, 加乙醇制成每1ml含5mg的溶液, 作为对照品溶液。

照薄层色谱法试验, 吸取上述两种溶液各5 μ l, 分别点于同一硅胶G薄层板上, 以环己烷-醋酸乙酯(85: 15)为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以1%香草醛硫酸溶液, 在105 $^{\circ}$ C烘约5分钟。

供试品色谱中, 在与对照品色谱相应的位置上, 显相同颜色的斑点。

【检查】

应符合散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】

清热除湿。

用于暴发火眼，眼边赤烂，黑睛云翳。

【用法与用量】

用玻璃棒蘸开水再蘸药少许，点眼角内，一日2~3次。

【注意】

忌食辛辣食物。

【规格】

每瓶装1.5g

【贮藏】

密封，置阴凉干燥处。

◎明目地黄丸(浓缩丸)

拼音名：mingmu Dihuang Wan

标准编号：WS3-B-1755

【处方】

熟地黄160g 山茱萸(制)80g 牡丹皮 60g山

药 80g 茯苓 60g 泽泻 60g 枸杞子 60g 菊花 60g 当归 60g 白芍 60g 蒺藜 60g 石决明 (煅)80g

【制法】

以上十二味，将熟地黄切片，加水煎煮三次，第一次3 小时，第二次2小时，第三次1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成相对密度为1.30~1.35(20)的清膏；取山茱萸、牡丹皮、白芍、菊花、当归40g、蒺藜、枸杞子以70%乙醇为溶剂，泽泻以45%乙醇为溶剂，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录17页)，分别浸渍24小时后，进行渗漉，收集合并漉液，回收乙醇，浓缩成相对密度为1.30~1.35(20)的清膏；取山药、茯苓、石决明及当归20g 粉碎成细粉，与上述各清膏混匀，制成浓缩丸，干燥，打光，即得。

【性状】

本品为深棕色的浓缩丸；气微香，味先甜而后苦、涩。

【鉴别】

(1)取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径4~6μm。

草酸钙针晶束存在于粘液细胞中，长80~240μm，针晶直径2~8μm。

薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微细的斜向交错纹理。

(2)取本品2g，加稀盐酸即发生大量气泡，此气遇氢氧化钙试液，即发生浑浊；再加水2ml，搅拌，滤过，滤液用氨试液调节至弱碱性，加草酸铵试液1滴，即生成白色沉淀。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录8 页)。

【功能与主治】

滋肾，养肝，明目。

用于肝肾阴虚，目涩畏光，视物模糊，迎风流泪。

【用法与用量】

口服，一次8~10丸，一日3次。

【规格】

每8丸相当于原生药3g

【贮藏】

密封。

◎明目蒺藜丸

拼音名：Mingmu Jili Wan

标准编号：WS3-B-1155

【处方】

黄连 4g 川芎 36g 白芷 36g 蒺藜(盐水炙)108g 地黄 72g 荆芥 75g 旋覆花 36g 菊花 108g 薄荷 36g 蔓荆子(微炒)72g 黄柏 36g 连翘 36g 密蒙花 36g 防风 36g 赤芍 36g 栀子(姜水炙)36g 当归 72g 甘草 36g 决明子(炒)36g 黄芩 72g 蝉蜕 36g 石决明 36g 木贼

36g

【制法】

以上二十三味，粉碎成细粉，过筛，混匀。

用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黄褐色的水丸；气微，味微辛、苦。

【鉴别】

取本品，置显微镜下观察：花粉粒类圆形，直径 $24\sim 30\mu\text{m}$ ，外壁有刺长 $3\sim 5\mu\text{m}$ ，具3个萌发孔。

纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

种皮石细胞淡黄色。

纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。

几丁质皮壳碎片淡黄棕色，半透明，密布乳头状或短刺状突起。

【检查】

其他 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 8

页)。

【功能与主治】

清热散风，明目退翳。

用于上焦火盛引起的暴发火眼，云蒙障翳羞明多眵，眼边赤烂，红肿痛痒，迎风流泪。

【用法与用量】

口服，一次9g，一日2次。

【注意】

忌食辛辣、腥、膻之物。

【规格】

每20粒重1g

【贮藏】

密封，防潮。

◎明目上清片

拼音名：Mingmu Shangqing Pian

标准编号：WS3-B-1557