

中华医学全集

国家中药标准全书 (三十七)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004

ISBN7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×10921/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD, 含配套书)

目 录

◎驴胶补血颗粒.....	1
◎驴胶补血颗粒(冲剂).....	4
◎绿萼点舌丸.....	6
◎绿袍散.....	9
◎绿雪.....	11
◎绿雪胶囊.....	15
◎罗布麻降压片.....	18
◎罗布麻叶冲剂.....	20
◎罗布麻叶片.....	27
◎罗浮山凉茶颗粒.....	29
◎罗汉果玉竹冲剂.....	32
◎罗黄降压片.....	34
◎罗勒.....	37
◎螺旋藻胶囊.....	39

◎螺旋藻片.....	42
◎裸花紫珠片.....	44
◎麻黄止嗽丸.....	46
◎麻仁合剂.....	48
◎麻仁润肠丸.....	50
◎麻仁滋脾丸.....	53
◎麻杏甘石合剂.....	55
◎麻杏止咳糖丸.....	57
◎马宝.....	59
◎马槟榔.....	61
◎马齿苋片.....	63
◎马钱子散.....	64
◎马应龙八宝眼膏.....	67
◎马应龙麝香痔疮膏.....	69
◎马鬃蛇药酒.....	71
◎麦味地黄口服液.....	74
◎麦味地黄片.....	75

◎麦味地黄丸(浓缩丸).....	79
◎麦芽片.....	81
◎脉安冲剂.....	83
◎脉君安片.....	85
◎脉络宁注射液.....	87
◎脉络通.....	91
◎脉络通颗粒.....	94
◎脉舒胶囊.....	98
◎蛮龙液.....	101
◎满山白冲剂.....	105
◎满山白片.....	108
◎满山白糖浆.....	112
◎慢肝解郁胶囊.....	115
◎慢肝养阴胶囊.....	118
◎慢惊丸.....	119
◎慢肾宝合剂.....	121
◎慢支紫红丸.....	124

◎芒果止咳片.....	128
◎猫爪草胶囊.....	130
◎毛冬青胶囊.....	133
◎毛鸡补血酒.....	136
◎毛鸡药酒.....	139
◎莓叶委陵菜片(雉子筵片).....	141
◎梅核气丸.....	143
◎梅苏冲剂.....	145
◎梅苏丸.....	147
◎梅翁退热颗粒.....	149
◎梅翁退热片.....	152
◎媚灵丸.....	156
◎虻虫.....	159
◎礞石滚痰片.....	162
◎猕猴桃颗粒.....	166
◎泌尿宁颗粒.....	168
◎秘制舒肝丸.....	169

◎密佗僧.....	172
◎蜜炼川贝枇杷膏.....	174
◎眠安宁合剂.....	177
◎眠安宁口服液.....	180
◎灭澳灵片.....	183
◎灭滴栓.....	186
◎闽东建曲.....	188

◎ 驴胶补血颗粒

拼音名：Lujiao Buxue Keli

标准编号：WS3-B-30

【处方】

阿胶 黄芪 党参 熟地黄白术 当
归

【性状】

本品为黄棕色的颗粒；味甜。

【鉴别】

(1)取本品30g，研细，加乙醇50ml，超声处理30分钟，放冷，滤过，滤液蒸至约1ml，作为供试品溶液。

另取当归对照药材0.5g，加乙醇10ml，同法制成对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录 VI B)试验，吸取上述两种溶液各10 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己

烷-醋酸乙酯(9:1)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的亮蓝白色荧光斑点。

(2)取本品50g，研细，加甲醇60ml，浸泡4小时，时时振摇，滤过，滤液加于已处理好的中性氧化铝柱(100~120目，5g，内径10~15mm)上，用40%甲醇100ml洗脱，收集洗脱液，置水浴上蒸干，残渣加水30ml使溶解，用水饱和的正丁醇提取2次，每次20ml，合并正丁醇液；用水洗涤2次，每次20ml，弃去水液，正丁醇置水浴上蒸干，残渣加甲醇0.5ml使溶解，作为供试品溶液。

另取黄芪甲甙对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录 VI B)试验，吸取上述两种溶液各2 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-甲醇-水(65:35:10)的下层溶液为展开剂，展开，取出，

晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105烘约5分钟。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】

总氮量 取本品1.5g，精密称定，照氮测定法(附录 IX L)测定，含氮量不得少于1.30%。

其他 应符合颗粒剂项下有关的各项规定(附录 I C)。

【功能与主治】

滋阴补血，健脾益气，调经活血。

用于久病体虚，气虚血亏型月经不调等妇科疾病。

【用法与用量】

开水冲服，一次20g，一日2次。

【规格】

每袋装20g

【贮藏】

密封，置阴凉干燥处。

◎ 驴胶补血颗粒(冲剂)

拼音名：Lujiao Buxue Keli

标准编号：WS3-B-2159

【处方】

阿胶 216g 黄芪 180g 党参 180g 熟地黄
120g 白术 90g 当归 60g

【制法】

以上六味，取当归、白术进行蒸馏，收集蒸馏液备用，残渣与黄芪、党参、熟地黄加水煎煮三次，第一次1.5小时，第二、三次各1小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.08~1.10(75~80)的清膏，冷却后，加乙醇使含醇量为50~55%，搅匀，冷却，静置，滤过，滤液回收乙醇，浓缩至相对密度为1.25，备用，阿胶粉碎成细粉，与蔗糖粉1800g混匀，加入上述浓缩液、蒸馏液，混匀，制成颗粒，干燥，过筛，

制成2000g，即得。

【性状】

本品为黄棕色的颗粒；味甜。

【鉴别】

取本品10g，加乙醚20ml，浸泡1小时，滤过，滤液挥干，残渣加0.5%香草醛硫酸溶液，显紫红色。

【检查】

总氮量 取本品1.5g，精密称定，照氮测定法测定，含氮量不得少于1.30%。

其他 应符合颗粒剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】

滋阴补血，健脾胃益气，调经养血。

用于久病体虚，血亏气虚，妇女血虚、经闭、经少等症。

【用法与用量】

口服，一次20g，一日4次。

【规格】

每袋装20g

【贮藏】

密封。

◎绿萼点舌丸

拼音名：Lu'e Dianshe Wan

标准编号：WS3-B-2434

【处方】

白梅花 450g 沉香 45g 血竭 90g 乳香(醋炙) 90g 没药(醋炙) 90g 葶苈子 90g 硼砂 90g 石决明 54g 雄黄 90g 牛黄 45g 冰片 45g 蟾酥 180g 朱砂 90g 珍珠 27g 麝香 27g 熊胆 9g 牛胆粉 18g

【制法】

以上十七味，除牛黄、蟾酥、麝香、冰片、熊胆、牛胆粉外，珍珠、雄黄、朱砂分别水飞或粉碎成极细粉；其余白梅花等八味粉碎成细粉。

将牛黄、蟾酥、麝香、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。

以熊胆、牛胆粉加水溶解泛丸，低温干燥，即得。

【性状】

本品为棕黄色至棕色的水丸；气香，味苦，麻舌。

【鉴别】

(1)取本品，置显微镜下观察：花粉粒近球形或长圆形，直径 $35\sim 45\mu\text{m}$ ，表面有条纹状雕纹。

种皮下皮细胞黄色，多角形或长多角形，壁稍厚。

具缘纹孔导管，纹孔密，内含淡黄色或黄棕色树脂状物。

无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。

不规则碎块淡黄棕色或橙黄色，有光泽。

不规则细小颗粒暗棕红色，有光泽，边缘暗黑色。

(2)取本品1.5g，研细，加乙醚20ml超声处理5分钟，滤过，残渣挥尽乙醚，加氯仿20ml超声处理10分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇5ml使溶解，将

甲醇液置已处理好的氧化铝柱(100~200目, 中性氧化铝3g, 内径9mm)上, 用氯仿50ml洗脱, 收集洗脱液, 蒸干, 残渣加甲醇1ml使溶解, 作为供试品溶液。

另取脂蟾毒配基和华蟾蜍次素对照品, 加甲醇分别制成每1ml各含1mg的溶液, 作为对照品溶液。

照薄层色谱法试验, 吸取上述两种溶液各5 μ l, 分别点于同一硅胶G薄层板上, 以环己烷-氯仿-丙酮(2:2:1)为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以10%硫酸乙醇溶液, 热风吹至斑点显色清晰。

供试品色谱中, 在与对照品色谱相应的位置上, 显相同颜色的斑点。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】

清热解毒, 消肿止痛。

用于疔疮痈肿初起, 咽喉、龈、舌肿痛。

【用法与用量】

口服，用黄酒送服，一次3粒，一日2次。

外用，用醋化开，敷于患处。

【注意】

孕妇忌服。

【规格】

每100粒重6g

【贮藏】

密封。

◎绿袍散

拼音名：Lupao San

标准编号：WS3-B-1032

【处方】

青黛 150g 黄柏 150g 山豆根 80g薄荷
80g 黄连 30g 儿茶(炒) 50g人中白(煅)50g
硼砂(炒)50g 冰片 50g

【制法】

以上九味，除冰片、青黛外，硼砂、儿茶，人中白研成细粉，其余黄柏等四味粉碎成细粉；将冰片研细，与上述粉末及青黛配研，过筛，混匀即得。

【性状】

本品为灰褐色的粉末；气清香，味苦。

【鉴别】

(1)取本品少量，滴加硝酸，产生气泡并显棕红色或黄棕色。

(2)取本品0.5g，进行微量升华，得白色升华物。

升华物加5%香草醛硫酸溶液1~2滴，显血红色，渐变成紫红色到蓝紫色。

(3)取本品1g，加水5ml，搅拌，滤过，滤液加盐酸2滴酸化后，点于姜黄试纸上使润湿，干燥，即显橙红色，放置后颜色变深，以氨试液熏之，呈黑绿色，氨液挥散后，试纸复显橙红色。

(4)取本品约0.3g，加水6ml，振摇，滤过，滤液少量蔗糖，溶解后，沿管壁加硫酸2ml，在两液接界