

中华医学全集

国家中药标准全书 (三十三)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004

ISBN 7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD, 含配套书)

目 录

◎精制银翘解毒片.....	1
◎颈复康颗粒.....	4
◎颈痛灵药酒.....	8
◎景天三七糖浆.....	12
◎九宝丸(九宝丹).....	14
◎九华膏.....	16
◎九华痔疮栓.....	18
◎九节菖蒲.....	21
◎九龙化风丸.....	22
◎九气心痛丸.....	26
◎九味羌活颗粒(冲剂).....	28
◎九味羌活片.....	31
◎九制大黄丸.....	33
◎九制香附丸.....	34

◎九制 豨草药酒.....	36
◎久痢丸(久痢丹).....	38
◎久芝清心丸.....	40
◎救急散.....	44
◎救惊散.....	47
◎救欠心胶囊.....	49
◎救心金丸.....	53
◎救心丸.....	58
◎局方至宝丸.....	61
◎桔贝合剂.....	64
◎桔梗冬花片.....	66
◎桔梗流浸膏.....	67
◎菊花茶调散.....	70
◎菊蓝抗流感片.....	72
◎菊明降压片.....	75
◎菊明降压丸.....	76
◎菊三七.....	78

◎橘半枳术丸.....	80
◎橘贝半夏冲剂.....	81
◎橘核疝气丸.....	84
◎橘核丸.....	85
◎橘红冲剂.....	87
◎橘红化痰丸.....	89
◎橘红梨膏.....	91
◎橘红枇杷片.....	93
◎橘红片.....	94
◎橘红痰咳煎膏.....	98
◎橘红痰咳颗粒.....	100
◎橘红痰咳液.....	102
◎橘络.....	106
◎决明降脂片.....	107
◎菌痢平片.....	109
◎开光复明丸.....	112
◎开胃健脾丸.....	114

◎开胃理脾丸.....	116
◎开胃山楂丸.....	120
◎开胸理气丸.....	122
◎开胸消食片.....	125
◎开郁老蔻丸.....	127
◎开郁舒肝丸.....	129
◎开郁顺气丸.....	131
◎康儿灵颗粒.....	133
◎康尔心胶囊.....	135
◎康肤酊.....	137
◎康妇消炎栓.....	140
◎康复灵栓.....	144
◎康复灵药膏.....	146
◎康乐鼻炎片.....	148
◎康氏牛黄解毒片.....	152
◎康氏牛黄解毒丸.....	155
◎康寿丸.....	158

◎抗扁桃腺炎合剂.....	162
◎抗病毒颗粒.....	165
◎抗病毒栓.....	169
◎抗风湿液.....	171
◎抗感解毒颗粒.....	174
◎抗感灵片.....	177
◎抗感冒颗粒.....	182

◎精制银翘解毒片

拼音名：JingzhiYinqiaoJieduPian

标准编号：WS3-B-0660

【处方】

扑热息痛 72g 桔梗 120g 连翘 200g 淡豆豉 100g 甘草 100g 淡竹叶 80g 金银花 200g 牛蒡子 120g 荆芥穗 80g 薄荷脑 0.6g

【制法】

以上十味，扑热息痛、桔梗分别粉碎成细粉，荆芥穗提取挥发油，将荆芥穗油、薄荷脑用适量乙醇溶解；其余连翘等六味加水煎煮二次，滤过，合并滤液，滤液浓缩成膏，加入桔梗、扑热息痛粉末及辅料适量，混匀，制成颗粒，烘干，放冷，加入荆芥穗油、薄荷脑乙醇溶液，混匀，应出颗粒数为408g，压片，包糖衣，即得。

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味苦。

【鉴别】

取含量测定项下的丙酮溶液，用为供试品溶液。

另取扑热息痛对照品0.5mg，加丙酮1ml使溶解，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取上述两种溶液各20 μ l，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以丙酮-氯仿(15:4)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(254nm)下检视，供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定(附录11页)。

【含量测定】

对照品溶液的制备取在105℃干燥至恒重的扑热息痛对照品约50mg精密称定，加无水乙醇适量，振摇使溶解，配成每ml含扑热息痛0.005mg的溶液为对照品溶液。

供试品溶液的制备取本品20片，除去糖衣，精密称定，研细，精密称取适量(约相当于扑热息痛50mg)，置100ml量瓶中，加丙酮约80ml，超声处理1小时，室温放置30分钟，加丙酮至刻度，摇匀，滤过，弃去初滤液，精密吸取续滤液5ml，水浴上蒸干后残渣加无水乙醇适量使溶解，滤过，滤液移置50ml量瓶中，用于乙醇洗涤残渣与滤器，洗液并入滤液中，加无水乙醇至刻度，摇匀。

精密量取5ml置50ml量瓶中，再加无水乙醇稀释至刻度，摇匀。

照分光光度法(附录51页)，在 $249\text{nm} \pm 1\text{nm}$ 波长处测定吸收度，计算即得。

本品含扑热息痛($\text{C}_8\text{H}_9\text{O}_2\text{N}$)应为标示量的90.0%~110.0%。

【功能与主治】

清热散风，解表退烧。

用于流行性感冒，发冷发烧，四肢酸懒，头痛咳

嗽，咽喉肿痛，温毒发颐，两腮赤肿。

【用法与用量】

口服，一次3~5片，一日2次，儿童酌减。

【规格】

每片含扑热息痛44mg

【贮藏】

密封，置阴凉干燥处。

◎颈复康颗粒

拼音名：JingfukangKeli

标准编号：WS3-B-3496

【处方】

黄芪	党参	丹参	白芍	生地黄	石
决明	威灵仙	花蕊石(煨)	葛根	黄柏	
秦艽	王不留行(炒)	川芎	苍术	羌活	
桃仁(去皮)	乳香(制)	没药(制)	红花	地	
龙(酒炙)	土鳖虫(酒炙)				

【性状】

本品为黄褐色或棕褐色的颗粒；味微苦。

【鉴别】

(1)取本品2.5g，研细，置具塞锥形瓶中，加乙醚10ml，振摇10分钟，静置30分钟，滤过，滤液置蒸发皿中，挥去乙醚，残渣加5%香草醛硫酸溶液2~3滴，即显紫色。

(2)取本品4.0g，研细，置100ml锥形瓶中，加乙醇25ml，水浴加热回流1小时，放至室温，滤过，滤液作为供试品溶液。

另取黄柏对照药材0.5g，加乙醇25ml，水浴加热回流10分钟，放至室温，滤过，滤液作为对照药材溶液。

再取盐酸小檗碱对照品，加乙醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录VI B)试验，吸取供试品溶液5 μ l、对照药材及对照品溶液各1 μ l，分别点于同一硅

胶G薄层板上,以正丁醇-冰醋酸-水(7:1:2)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中,在与对照药材及对照品色谱相应的位置上,显相同的黄色荧光斑点。

(3)取芍药甙对照品,加无水乙醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录VI B)试验,吸取[鉴别](2)项下的供试品溶液5 μ l及对照品溶液1 μ l,分别点于同一硅胶G薄层板上,以氯仿-甲醇-醋酸乙酯(5:2:1.2)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以5%香草醛硫酸溶液,在105 $^{\circ}$ C加热数分钟。

供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【检查】

水分 不得过7.0%。

其他 应符合颗粒剂项下有关的各项规定(附录I C)。

【功能与主治】

活血通络，散风止痛。

用于颈椎病引起的脑供血不足，头晕，颈项僵硬，肩背酸痛，手臂麻木等症。

【用法与用量】

开水冲服，一次1~2袋。

一日2次，饭后服用。

【注意】

孕妇忌服。

消化道溃疡，肾性高血压等患者慎服或遵医嘱。

如有感冒，发烧，鼻咽痛等患者，暂停服此药。

【规格】

每袋装5g

【贮藏】

密封。

◎颈痛灵药酒

拼音名: JingtonglingYaojiu

标准编号: WS3-B-3497

【处方】

熟地黄 何首乌 黑芝麻 当归 丹参
黄芪 天麻 葛根 千年健 地枫皮 枸杞
子 白芍 骨碎补 威灵仙 狗脊 蛇蜕 桂
枝 牛膝 木瓜 乳香 没药 山药 槲
寄生 甘草 人参 鹿茸 麝香

【性状】

本品为棕黄色微有混浊的液体；味微甜、略苦。

【鉴别】

(1)取本品100ml，置蒸发皿中，水浴上加热，蒸至无醇味，放冷，加乙醚50ml提取，分取乙醚层，蒸干，残渣加氯仿1ml使溶解，作为供试品溶液。

另取大黄素对照品，加氯仿制成每1ml含0.4mg

的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录VIB)试验，吸取供试品溶液6 μ l、对照品溶液3 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚(30~60℃)-甲酸乙酯-甲酸(15:5:1)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点；置氨气中熏后，日光下检视，斑点变为红色。

(2)取当归对照药材1g，加氯仿10ml，超声处理15分钟，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加氯仿1ml使溶解，作为对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录VIB)试验，吸取上述对照品溶液及[鉴别](1)项下的供试品溶液各3 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-醋酸乙酯(9:1)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

(3)取〔鉴别〕(1)项下的水层，加水饱和的正丁醇提取2次，每次40ml，合并正丁醇液，用氨试液50ml洗涤，分取正丁醇液，置水浴上蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。

另取芍药甙对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录VI B)试验，吸取上述两种溶液各3 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以苯-甲醇-醋酸乙酯-氨水(10:4:2:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茴香醛-冰醋酸-硫酸(0.1:10:0.2)溶液，置105℃烘约5分钟。

供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】

乙醇量 应为28~34%。