

中华医学全集

国家中药标准全书 (三十四)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004

ISBN 7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD, 含配套书)

目 录

◎抗宫炎片.....	1
◎抗骨髓炎片.....	6
◎抗骨增生片.....	10
◎抗骨质增生丸.....	12
◎抗饥消渴片.....	14
◎抗菌痢灵片.....	16
◎抗菌消炎片(益金解毒片).....	19
◎抗癆冲剂.....	21
◎抗癆胶囊.....	23
◎抗癆丸.....	25
◎抗癆丸(浓缩水蜜丸).....	27
◎抗脑衰胶囊.....	29
◎抗热镇痉丸.....	33
◎抗腮灵糖浆.....	35

◎抗衰灵膏.....	37
◎抗栓保心片.....	39
◎抗栓胶囊.....	41
◎抗栓再造丸.....	44
◎咳喘膏.....	47
◎咳喘静糖浆.....	49
◎咳喘宁.....	51
◎咳喘舒片.....	53
◎咳喘顺丸.....	56
◎咳喘丸.....	59
◎咳灵胶囊.....	61
◎咳宁冲剂.....	64
◎咳宁糖浆.....	67
◎咳嗽枇杷糖浆.....	69
◎咳特灵胶囊.....	71
◎咳特灵片.....	74
◎咳欣康片.....	80

◎可达灵片.....	83
◎可利肝冲剂.....	87
◎克痢痧胶囊.....	89
◎克痢痧微丸.....	92
◎克痛酊.....	95
◎克泻灵片.....	98
◎克泻敏颗粒.....	100
◎克泻敏丸.....	104
◎克银丸.....	105
◎口疳吹药.....	108
◎口腔溃疡散.....	110
◎口腔炎喷雾剂.....	112
◎口炎清颗粒.....	116
◎苦参片.....	119
◎苦参栓.....	122
◎苦胆草片.....	125
◎苦胆片.....	126

◎苦胆丸.....	131
◎苦豆草.....	132
◎苦甘冲剂.....	136
◎苦楝子.....	139
◎快胃片.....	141
◎快应茶.....	144
◎宽胸利膈丸.....	146
◎宽胸气雾剂.....	149
◎宽胸舒气化滞丸.....	151
◎宽中顺气丸.....	153
◎溃平宁冲剂.....	156
◎溃疡冲剂.....	160
◎溃疡胶囊.....	163
◎溃疡灵胶囊.....	165
◎溃疡宁胶囊.....	167
◎溃疡宁片.....	170
◎溃疡片.....	172

◎ 溃疡散胶囊.....	175
◎ 坤宝丸.....	178
◎ 坤灵丸.....	182
◎ 坤顺丸.....	184
◎ 昆明山海棠片.....	187

◎抗宫炎片

拼音名：KanggongyanPian

标准编号：WS3-B-2149

【处方】

广东紫珠干浸膏 167g 益母草干浸膏 44g
乌药干浸膏 39g

【制法】

以上三味，粉碎成细粉，加辅料适量，混匀，制成颗粒，干燥，压制成1000片，包糖衣，即得。

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色；味涩、微苦。

【鉴别】

取本品5片，除去糖衣，研细，加乙醇30ml，加热回流1小时，滤过，滤液照下述方法试验：

(1)取滤液1ml，加1%三氯化铁溶液1滴，生成绿黑

色沉淀。

(2)取滤液1ml, 加1%三氯化铁溶液和1%铁氰化钾溶液等体积的混合液(宜临用前配制)1滴, 显深绿色, 渐变深兰色, 放置后生成深兰色沉淀。

(3)取滤液15ml, 置水浴上蒸干, 残渣加盐酸(0.1mol/L)5ml使溶解, 滤过, 取滤液分置三试管中, 一管加碘化铋钾试液2~3滴, 生成橙红色沉淀; 一管加碘化汞钾试液2~3滴, 生成黄白色沉淀; 一管加硅钨酸试液2~3滴, 生成灰白色沉淀。

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】

清湿热, 止带下。

用于因慢性宫颈炎引起的湿热下注, 赤白带下, 宫颈糜烂, 出血等症。

【用法与用量】

口服, 一次6片, 一日3次。

【注意】

孕妇忌服。

服后偶见头晕，可自行消失，不必停药。

【贮藏】

密封。

注 1.广东紫珠干浸膏的质量标准[制法] 取广东紫珠，润透，切成小段或原片，加水煎煮二次，第一次3小时，第二次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至稠膏状，减压干燥，即得。

每1g干浸膏相当于原药材33.0g。

[性状] 本品为棕褐色的疏松固体；气微，味苦、涩，易吸潮。

[鉴别] 取本品约0.5g，研细，加乙醇20ml，置水浴上回流1小时，滤过，滤液照下述方法试验：

(1)取滤液点于滤纸上，干后，置紫外光灯(365nm)下观察，显淡蓝色荧光，喷洒2%三氯化铝乙醇液后，荧光增强。

(2)取滤液1ml, 加1%三氯化铁溶液, 即产生绿黑色沉淀。

(3)取滤液1ml, 加1%三氯化铁溶液和1%铁氰化钾溶液等体积的混合液(临用前配制)1滴, 即显深绿色, 渐变深蓝色, 放置后底部有较多的深蓝色沉淀。

[检查] 水分 不得过5%。

[功能与主治] 活血, 止血, 除热, 解毒。

用于吐血, 咯血, 便血, 崩漏, 创伤出血, 痈疽肿毒, 喉痹。

[贮藏] 密封, 置干燥处。

2.益母草干浸膏的质量标准[制法] 取益母草, 切碎, 加水煎煮二次, 每次2小时, 合并煎液, 滤过。

滤液浓缩成稠膏状, 减压干燥, 即得。

每1g干浸膏相当于原药材14.0g。

[性状] 本品为棕褐色的疏松固体; 气微, 味苦, 易吸潮。

[鉴别] 取本品0.5g, 研碎, 加乙醇20ml, 加热

回流1小时，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加盐酸(0.1mol/L)5ml溶解后，滤过，取滤液1ml，加碘化铋钾试液1~2滴，即生成棕红色沉淀，另取滤液1ml，加硅钨酸试液1~2滴，即生成灰白色沉淀。

[检查] 水分 不得过5%。

[功能与主治] 活血调经，利尿消肿。

用于月经不调，痛经闭经，恶露不尽，水肿尿少；急性肾炎水肿。

[注意] 孕妇禁用。

[贮藏] 密封，置干燥处。

3. 乌药干浸膏的质量标准[制法] 取乌药，切片，加水煎煮二次，每次2小时，合并煎液，滤过。

滤液浓缩成稠膏，减压干燥，即得。

每1g干浸膏约相当于原材料18g。

[性状] 本品为棕褐色的疏松固体；气微，味苦、辛、易吸潮。

[检查] 水分 不得过5%。

总灰分 不得过7%。

[功能与主治] 顺气止痛，温肾散寒。

用于胸腹胀痛，气逆喘急，膀胱虚冷，遗尿尿频，
氤气，痛经。

[贮藏] 密封，置阴凉干燥处。

◎抗骨髓炎片

拼音名：kanggusuiyanPian

标准编号：WS3-B-30

【处方】

金银花 蒲公英 地丁 半枝莲白头翁
白花蛇舌草

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后显棕黑色；味微苦，
有引湿性。

【鉴别】

取本品6片，除去糖衣，研碎，加乙醇30ml，于

水浴回流1小时，滤过，得滤液约22ml，滤液照下述方法进行试验：

(1)将滤液点于滤纸上，喷以1%三氯化铝乙醇溶液，干燥后显黄色斑点，于紫外光灯下观察，黄色斑点呈极明显的黄色或黄绿色荧光。

(2)取滤液1ml，加等量3%碳酸钠溶液，于水浴上煮沸3分钟，冷却后加新配制的重氮化试剂1~2滴，显红色。

(3)取滤液1ml，加亚磺酰氯2~3滴，混匀后，蒸干，于残渣中滴入羟胺乙醇溶液2滴，再加入氢氧化钾乙醇溶液2滴，加热，放冷后，加2mol/L的盐酸酸化，再滴入1%三氯化铁溶液1滴，应显红至紫色，

【检查】

应符合片剂项下有关的各项规定。

【含量测定】

对照品溶液的制备

精密称取芦丁对照品适量(相当于120℃干燥至

恒重的芦丁20mg), 置100ml量瓶中, 加60%乙醇适量, 置水浴上微热使溶解, 放凉, 用60%乙醇稀释至刻度, 摇匀, 精密量取25ml, 置50ml量瓶中, 加水稀释至刻度, 摇匀, 即得(每1ml中含无水芦丁0.1mg), 标准曲线的制备

精密量取对照品溶液0.0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0ml, 分别置10ml量瓶中, 各加30%的乙醇溶液并使成5.0ml, 分别精密加入亚硝酸钠溶液(1:20)0.3ml, 摇匀, 放置6分钟, 再加入硝酸铝溶液(1:10)0.3ml, 摇匀, 放置6分钟后, 加1mol/L的氢氧化钠溶液4ml, 各以30%乙醇溶液稀释至刻度, 振摇, 放置10分钟, 以第一瓶作空白, 照分光光度法(附录V B), 在510nm的波长处测定吸收度, 以吸收度为纵坐标, 浓度为横坐标, 绘制标准曲线。

测定法 取本品25片, 除去糖衣, 精密称定, 研细, 取粉末约4g, 精密称定, 置圆底小烧瓶中, 加入30%的乙醇溶液适量, 于水浴上加热回流60分钟, 放

冷，倾出，以30%的乙醇溶液稀释到100ml，摇匀，以慢速滤纸滤过，弃去初滤液，精密量取续滤液2ml，置10ml量瓶中，精密加入亚硝酸钠溶液(1:20)0.3ml，摇匀，放置6分钟后，加入硝酸铝溶液(1:10)0.3ml，摇匀，放置6分钟，加入1mol/L的氢氧化钠溶液4ml，摇匀，以30%乙醇溶液稀释至刻度，摇匀，放置10分钟，并作一空白，照分光光度法(附录V B)，在510nm的波长处测定吸收度。

从标准曲线上读出供试品溶液中芦丁的重量，计算，即得。

本品每片含总黄酮以无水芦丁($C_{27}H_{30}O_{16}$)计，不得少于9mg。

【功能与主治】

清热解毒，散瘀消肿。

用于附骨疽及骨髓炎属热毒血瘀者。

【用法与用量】

口服，一次8~10片，一日3次，或遵医嘱，儿童

酌减。

【注意】

孕妇慎用。

【规格】

每素片重0.4g(相当于原药材3g)

【贮藏】

密封。

◎抗骨增生片

拼音名：KangguZengshengPian

标准编号：WS3-B-1338

【处方】

熟地黄	240g	鹿衔草	136g	骨碎补(烫)	
136g鸡血藤	136g	淫羊藿	136g	肉苁蓉	136g
莱菔子(炒)	86g				

【制法】

以上七味，取鸡血藤68g粉碎成细粉，剩余的鸡