

中华医学全集

国家中药标准全书 (三十五)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华医学全集/王宝勤主编. —北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004

ISBN 7-900106-23-5

I. 中… II. 王… III. 医药学—文集—汇编

IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD, 含配套书)

目 录

◎蜡梅花.....	1
◎辣椒风湿膏.....	2
◎莱阳梨膏.....	4
◎莱阳梨止咳颗粒.....	6
◎莱阳梨止咳口服液.....	9
◎莱阳梨止咳糖浆.....	12
◎阑尾消炎片.....	15
◎阑尾消炎丸.....	16
◎蓝花药.....	19
◎榄葱茶.....	22
◎烂耳散.....	23
◎烂积丸.....	26
◎狼疮丸.....	29
◎狼毒.....	31

◎老范志万应神曲.....	35
◎老蔻丸.....	37
◎老年咳喘片.....	40
◎乐儿康糖浆.....	42
◎乐脉颗粒.....	44
◎勒马回片.....	48
◎勒马回注射液.....	51
◎雷公藤片.....	55
◎肋腺炎片.....	61
◎理气定喘丸.....	62
◎理气舒心片.....	67
◎理中丸(党参理中丸 浓缩丸).....	69
◎理中丸(党参理中丸).....	72
◎力加寿片.....	75
◎利鼻片.....	80
◎利胆片.....	82
◎利胆石颗粒.....	85

◎利胆止痛片.....	88
◎利肺片.....	90
◎利肝隆冲剂.....	92
◎利肝隆片.....	94
◎利肝片.....	97
◎利膈丸.....	99
◎利脑心胶囊.....	101
◎利心丸.....	105
◎利心丸(浓缩水丸).....	108
◎利咽解毒颗粒.....	110
◎利咽灵片.....	113
◎荔花鼻窦炎片.....	115
◎痢必灵片.....	117
◎痢速宁片.....	119
◎痢特敏片.....	121
◎痢泻灵片.....	125
◎痢炎宁片.....	127

◎连蒲双清片.....	129
◎连翘败毒膏.....	132
◎连翘败毒片.....	135
◎连翘败毒丸.....	137
◎莲必治注射液.....	140
◎莲胆消炎片.....	146
◎莲花峰茶.....	150
◎莲芝消炎胶囊.....	153
◎良园枇杷叶膏.....	157
◎凉膈丸.....	160
◎两面针镇痛片.....	162
◎两仪膏.....	164
◎辽源七厘散.....	166
◎疗肺宁片.....	168
◎临江风药.....	170
◎灵宝如意丸.....	175
◎灵丹草颗粒.....	177

◎灵龙感冒胶囊.....	179
◎灵猫香散.....	182
◎灵砂(辰砂).....	186
◎灵仙跌打片.....	189

◎蜡梅花

拼音名：Lameihua

英文名：FLOS CHIMONANTHI

来源/处方：本品为蜡梅科植物蜡梅Chimonanthus praecox (L.) Link的干燥花蕾。

1~3月采摘，晒干或烘干。

【性状】

本品呈圆形、矩形或倒卵形，长1~1.5cm，宽0.4~0.8cm，花被叠合作花芽状，棕黄色，下半部由多数膜质鳞片研包，鳞片黄褐色，略呈三角形，有微毛。

气香，味微甜而后苦，稍有油腻感。

【性味】

甘、微苦。

【功能与主治】

解暑生津。

用于热病烦渴，胸闷，咳嗽。

【用法与用量】

3~6g；外用适量，浸油涂。

【贮藏】

置干燥处。

◎辣椒风湿膏

拼音名：Lajiao Fengshi Gao

标准编号：WS3-B-1867

【处方】

辣椒 250g 薄荷脑 30g 冰片 30g

【制法】

以上三味，取辣椒粉碎成粗粉，加乙醇加热回流提取三次，每次2 小时，合并提取液，滤过，滤液回收乙醇，制成浸膏，备用；另取橡胶250g、羊毛脂90g、氧化锌250g、松香255g和蜂蜡80g，制成基质，加入薄荷脑、冰片、辣椒浸膏，制成涂料。

进行涂膏，切段，盖衬，切成小块，即得。

【性状】

本品为浅棕黄色的片状橡皮膏；有特异香气。

【鉴别】

取本品约10cm²，除去贴面隔衬，用乙醚20ml溶解药膏，取溶液1滴点于滤纸上，晾干，再滴加氢氧化钠液(0.1mol/L)2滴，晾干，置紫外光灯(365nm)下观察，显蓝色荧光。

【检查】

含膏量 照橡胶膏剂项下含膏量测定法(附录18页)测定，用乙醚作溶剂。

每100cm²应不少于1.7g。

其他 应符合橡胶膏剂项下有关的各项规定(附录18页)。

【功能与主治】

祛风散寒，舒筋活络，消肿止痛。

用于关节疼痛，腰背酸痛，扭伤瘀肿及慢性关节炎和未溃破的冻疮等。

【用法与用量】

贴于患处。

【注意】

(1)皮肤表面有破口的患处及溃破的冻疮不宜使用。

(2)敷贴后若有不适，应停止敷贴。

【贮藏】

密闭，置阴凉干燥处。

◎莱阳梨膏

拼音名：Laiyangli Gao

标准编号：WS3-B-1802

【处方】

莱阳梨清膏 600g 陈皮 15g 浙贝母 15g 法半夏 15g 化橘红 15g

【制法】

以上五味，除莱阳梨清膏外，浙贝母粉碎成细粉，

过筛，陈皮、法半夏、化橘红加水煎煮二次，合并煎液，加入蔗糖600g，溶解后滤过，滤液中加入莱阳梨清膏，浓缩至相对密度为1.38，加入浙贝母粉，搅匀，即得。

【性状】

本品为棕黑色稠厚的半流体；气微，味甜、微苦。

【检查】

除不溶物、相对密度不检查外，其他应符合煎膏剂项下有关的各项规定(附录13页)。

【功能与主治】

止咳化痰，生津止渴。

用于咳嗽痰喘，痰中带血，咽干口渴，声重音哑等症。

【用法与用量】

口服，一次15g，一日2次。

【注意】

外感咳嗽者忌服。

【贮藏】

密封，置阴凉处。

注 莱阳梨清膏的制法：取莱阳梨，去尽虫蚀、腐烂及梨柄，捣碎后轧汁，滤过，浓缩至相对密度为1.30，即得。

◎莱阳梨止咳颗粒

拼音名：Laiyangli Zhike Keli

标准编号：WS3-B-2762

【处方】

莱阳梨清膏 260g 麻黄提取液 50ml 杏仁
水 15ml 百合流浸膏 10ml 远志流浸膏 12.5ml
北沙参流浸膏 20ml 薄荷脑 0.0625g

【制法】

以上八味，将麻黄提取液、五种流浸膏，减压浓缩至相对密度为1.20(60~70℃)的稠膏状；将莱阳梨清膏浓缩至相对密度为1.38(60~70℃测)的稠膏状；

蔗糖350g粉碎成细粉；将蔗糖粉与糊精混合，加入上述两种稠膏，充分混匀，制成颗粒，干燥。

取薄荷脑溶于适量乙醇中，加入杏仁水混合，喷入颗粒，混匀，密闭2小时，分装成100袋，即得。

【性状】

本品为黄棕色的颗粒；气香、清凉，味甜略酸。

【鉴别】

(1)取本品16g，置50ml锥形瓶中，加水10ml使湿润，瓶塞处夹一条用碳酸钠湿润过的二硝基苯酚试纸，密塞，置热水浴中10分钟，试纸显砖红色。

(2)取本品16g，加水30ml，振摇使溶解，滤过，滤液加浓氨试液1ml，用乙醚-乙醇(8：2)混合液提取2次，每次15ml，合并提取液，用无水硫酸钠脱水滤过，滤液挥干溶剂，残渣加甲醇1ml使溶液，作为供试品溶液。

另取盐酸麻黄碱对照品，用甲醇制成每1ml含5mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录VI B)试验,吸取供试品溶液15ml与对照品溶液5ml,分别点于同一硅胶G薄层板上,以氯仿-甲醇-氨试液(20:5:0.5)为展开剂,展开,展距17cm,取出,晾干,喷以0.5%茚三酮乙醇液,于105℃烘约10分钟,供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【检查】

应符合颗粒剂项下有关的各项规定(附录I C)。

【功能与主治】

镇咳祛痰。

用于伤风、感冒引起的咳嗽多痰,急、慢性气管炎。

【用法与用量】

开水冲服,一次8g,一日4次;儿童酌减或遵医嘱。

【规格】

每袋装8g; 每瓶装80g

【贮藏】

密闭，防潮。

注：莱阳梨流浸膏，北沙参流浸膏，百合流浸膏、桔梗流浸膏、麻黄提取液、远志流浸膏的制法见莱阳梨止咳口服液项下的注。

◎莱阳梨止咳口服液

拼音名：Laiyangli Zhike Koufuye

标准编号：WS3-B-2761

【处方】

莱阳梨清膏 260g 麻黄提取液 50ml 杏仁
水 15ml 北沙参流浸膏 20ml 百合流浸膏 10ml
远志流浸膏 12.5ml 桔梗流浸膏 25ml 薄荷脑
0.0625g

【制法】

以上八味，取蔗糖250g，加水适量溶解，加苯甲酸钠适量及莱阳梨清膏，煮沸，趁热滤过，待降至室

温，依次加入麻黄提取液，北沙参流浸膏、桔梗流浸膏、远志流浸膏、百合流浸膏、杏仁水、薄荷脑(用乙醇5ml溶解)、搅匀，加水至1000ml，滤过，即得。

【性状】

本品为棕黄色至棕褐色的液体；具薄荷香气，味甜、微酸、有清凉感。

【检查】

相对密度 应为1.10~1.20。

pH值 应为4.0~5.5。

其他 应符合合剂项下有关的各项规定(附录 I J)。

【功能与主治】

镇咳祛痰。

用于伤风感冒引起的咳嗽多痰，急、慢性气管炎。

【用法与用量】

口服，一次10ml，一日4次，小儿酌减。

【规格】