

中华医学全集

国家中药标准全书 (三十一)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

目 录

◎健脾丸(浓缩丸).....	1
◎健脾消食丸.....	3
◎健脾养胃颗粒.....	6
◎健脾益肾冲剂.....	9
◎健脾增力丸.....	11
◎健脾壮腰药酒(十二红药酒).....	14
◎健脾资生丸.....	16
◎健身安胎丸.....	18
◎健身长春膏.....	21
◎健身宁片.....	23
◎健身全鹿丸.....	25
◎健身糖浆.....	28
◎健身消导冲剂.....	29
◎健身药酒.....	31

◎健神片.....	33
◎健肾地黄丸.....	35
◎健肾生发丸.....	36
◎健肾壮腰丸.....	39
◎健胃固肠散.....	41
◎健胃宽胸丸.....	43
◎健胃片.....	45
◎健胃消食片.....	47
◎健胃消炎颗粒.....	49
◎健胃止痛片.....	53
◎健心片.....	55
◎健阳片.....	57
◎姜冲剂.....	61
◎姜枣祛寒冲剂.....	63
◎降矾丸.....	65
◎降酶灵胶囊.....	66
◎降酶灵胶囊.....	69

◎降气定喘丸.....	71
◎降舒灵片.....	74
◎降糖甲片.....	75
◎降糖胶囊.....	78
◎降糖宁胶囊.....	81
◎降糖舒胶囊.....	84
◎降压袋泡茶.....	86
◎降压片.....	88
◎降压平片.....	91
◎降压丸.....	93
◎降脂减肥片.....	96
◎降脂胶丸.....	99
◎降脂灵胶囊.....	102
◎降脂灵片.....	104
◎降脂宁颗粒.....	107
◎焦楂化滞丸.....	110
◎脚气散.....	112

◎接骨灵贴膏.....	114
◎接骨片.....	117
◎接骨七厘片.....	119
◎接骨丸.....	122
◎接骨续筋片.....	124
◎结核灵片.....	126
◎结核丸(龟龙丸).....	130
◎结石通茶(玉石茶).....	134
◎结石通片.....	136
◎截疟七宝丸.....	138
◎竭红跌打酊.....	141
◎解表清肺丸.....	144
◎解表清金散.....	147
◎解表追风丸.....	150
◎解毒降脂片.....	153
◎解毒生肌膏.....	156
◎解毒万灵丸.....	159

◎解肌宁嗽片.....	163
◎解肌清肺丸.....	166
◎解痉镇痛酊.....	169
◎解热感冒片.....	171
◎解热消炎胶囊.....	174
◎解暑片.....	179
◎解心痛片.....	181
◎解郁安神冲剂.....	183
◎解郁和肝丸.....	185
◎金胆片.....	188
◎金佛酒.....	191

◎健脾丸(浓缩丸)

拼音名：JianpiWan

标准编号：WS3-B-1410

【处方】

党参 200g 枳实(炒) 200g 陈皮 200g 麦芽(炒) 200g 白术(炒) 300g 山楂(炒) 150g

【制法】

以上六味，将党参137.5g及麦芽粉碎成细粉，剩余党参及其余枳实等五味粉碎成粗粉，加水煎煮二次，第一次3小时，第二次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成相对密度为1.30~1.35(20℃)的稠膏，上述粉末混匀，制丸，干燥，打光，即得。

【性状】

本品为深棕色的浓缩丸；味微酸、稍苦。

【鉴别】

取本品，置显微镜下观察：表面细胞纵列，常有

一个长细胞与2个短细胞与相连接，长细胞壁厚，波状变曲，木化。

石细胞斜方形或多角形，一端稍尖，壁厚纹孔稀疏。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录8页)

【功能与主治】

健脾开胃。

用于脾胃虚弱，脘腹胀满，食少便溏。

【用法与用量】

口服，一次8丸，一日3次。

【规格】

每8丸相当于原生药材3g

【贮藏】

密封。

◎健脾消食丸

拼音名: JianpiXiaoshiWan

标准编号: WS3-B-1411

【处方】

白术(炒) 40g 枳实(炒) g 木香 10g 草豆蔻 10g 鸡内金(醋炙) 20g 槟榔(炒焦) 20g 荸荠粉 30g

【制法】

以上七味, 除荸荠粉外, 其余白术等六味粉碎成细粉, 过筛, 混匀, 与荸荠粉配研, 过筛, 混匀。

每100g粉末加炼蜜80~90g制成大蜜丸, 即得。

【性状】

本品为棕褐色大蜜丸; 气香, 味苦、微甜。

【鉴别】

(1) 取本品, 置显微镜下观察: 草酸钙针晶细小, 长10~32μm, 不规则地充塞于薄壁细胞中。

草酸钙方晶成片存在于薄壁细胞中。

内种皮石细胞棕红色，壁厚，内含硅质块。

内胚乳碎无色，壁较厚，有较多大的类圆形纹孔。

淀粉多为单粒，呈不规则椭圆形或近于圆形，直径 $10\sim 25\mu\text{m}$ ，脐点点状或十字状。

(2)取本品1丸，切碎，加硅藻土1.5g研匀，加乙醇20ml，超声处理20分钟，滤过，滤液挥干，残渣加醋酸乙酯0.5ml使溶解，作为供试品溶液。

另取白术对照材0.5g同法制成对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取上述两种溶液各 $6\mu\text{l}$ 分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚($60\sim 90^{\circ}\text{C}$)—醋酸乙酯(50:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%香草醛硫酸溶液，热风吹至斑点显色清晰。

供试品色谱中在与对照药材色谱相同的位置上，显相同颜色的斑点。

(3)取木香对照药材0.5g，同〔鉴别〕(2)法制

成对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验,吸取〔鉴别〕(2)项下的供试品溶液与上述对照药材溶液各6 μ l,分别点于同一硅胶G薄层板上,以环己烷-丙酮(10:3)为展开剂,展开,取出晾干,喷以10%香草醛硫酸溶液,热风吹至斑点显色清晰。

供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【检查】

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录8页)

【功能与主治】

健脾,消食,化积。

用于小儿脾胃不健 引起的乳食停滞,脘腹胀满,食欲不振,面黄肌瘦,大便不调。

【用法与用量】

口服,一岁以内每次服半丸,一岁至二岁每次服1丸,二岁至四岁每次服1丸半,四岁以上每次服2丸;

一日2次，或遵医嘱。

【规格】

每丸重3g

【贮藏】

密封。

◎健脾养胃颗粒

拼音名：JianpiYangweiKeli

标准编号：WS3-B-36

【处方】

砂仁 14g 陈皮 14g 厚朴 28g 青皮 14g
猪苓 112g 白术 112g 甘草 56g 党参 112g
茯苓 112g 酵母粉 88g 淀粉酶 9g

【制法】

以上十一味，将砂仁粉碎成细粉，过筛，备用。

陈皮水蒸气蒸馏提取挥发油，用适量乙醇溶解，
备用。

取党参、猪苓、茯苓、甘草四味与陈皮渣合并加水煎煮二次，第一次2小时，第二次1小时，滤过，合并煎液，浓缩至相对密度1.06(98℃)。

厚朴、青皮、白术三味药以60%乙醇回流提取，回收乙醇至无醇味。

将水、醇两项清膏浓缩至相对密度1.28~1.30(98℃)，放冷后加入淀粉160g，搅匀制成大颗粒，干燥，兑入酵母粉、糖化素、砂仁粉、砂糖330g，粉碎成细粉，混匀，用适量乙醇制成颗粒，干燥。

兑入陈皮油醇溶液及适量香精，密闭，制成颗粒750g，即得。

【性状】

本品为淡棕黄色颗粒；气香，味甜。

【鉴别】

取本品2g，置具塞锥形瓶中，加乙醚20ml，振摇10分钟，滤过，取滤液10ml，挥干后，加10%香草醛硫酸溶液，显紫色。

【检查】

应符合颗粒剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】

健脾消食，止泻利尿。

用于胃肠衰弱，消化不良，呕吐便泻，腹胀腹痛，小便不利，面黄肌瘦。

【用法与用量】

口服，成人一次9g，儿童一次1.5g，一日2次，周岁以内酌减。

【注意】

忌油腻硬食，痢疾初起忌服。

【规格】

每袋装9g

【贮藏】

密封，置阴凉干燥处。

◎健脾益肾冲剂

拼音名: JianpiYishenchongji

标准编号: WS3-B-1606

【处方】

党参 150g 枸杞子 150g 女贞子 150g 白
术 90g 菟丝子 50g 补骨脂(盐炙) 30g

【制法】

以上六味,加水煎煮三次,第一次2小时,第二、三次各1小时,滤过合并滤液,静置,滤过。

滤液浓缩至相对密度1.25~1.30(50℃)的清膏。

取清膏1份,蔗糖6份及乙醇适量,制成颗粒,干燥,即得。

【检查】

本品为棕色的颗粒;味甜、微苦。

【鉴别】

(1)取本品50mg,置10ml具塞试管中,精密加

入乙醇10ml于60℃水浴中温浸3小时，每小时振摇一次，滤过。

滤液照分光光度法(附录51页)测定，在 $283\pm 3\text{nm}$ 的波长处有最大吸收，在 $258\pm 3\text{nm}$ 的波长处有最小吸收。

(2)取本品30g，加20%盐酸乙醇溶液10ml，氯仿60ml，回流提取40分钟，滤过滤液浓缩至1ml，作为供试品溶液。

另取异补骨脂素对照品，加醋酸乙酯制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取上述两种溶液各5 μ l，分别点于同一硅胶G F₂₅₄薄层板上，以正己烷-醋酸乙酯(8:2)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】

应符合冲剂项下有关的各项规定(附录10页)。

【功能与主治】

健脾益肾。

用于减轻肿瘤病人术后放、化疗副反应，提高机体免疫功能以及脾肾虚弱所引起的疾病。

【用法与用量】

开水冲服，一次30g，一日2次。

【规格】

每袋重30g

【贮藏】

密封。

◎健脾增力丸

拼音名：JianpiZengliWan

标准编号：WS3-B-1809

【处方】

麦芽(炒) 320g 陈皮 160g 六神曲(麸炒)