

最新中医药管理规范实务全书

# 国家中药生产标准 (四十六)

主编：韩 问

吉林摄影出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

最新中医药管理规范实务全书/韩问主编. —长春:  
吉林摄影出版社, 2005.1  
ISBN 7-80606-771-X  
I. 最… II. 韩… III. 中药管理-药政  
管理-丛书 IV. R288-51

最新中医药管理规范实务全书·国家中药生产标准(四十六)

---

作 者: 韩问

排版设计: 盛世文化传播(北京)有限公司

---

出版发行: 吉林摄影出版社

社 址: 长春市人民大街124号

邮政编码: 130021

---

印 刷: 北京通成印刷厂

开 本: 880×1230mm 1/32

总印张: 400. 字数: 4 100 千字

版 次: 2005年1月第一版

2005年1月第一次印刷

印 数: 1-500 册

书 号: ISBN 7-80606-771-X/R.116

总定价: 1599.00 本册定价: 19.50

# 目 录

|                |    |
|----------------|----|
| ◎顺气消食化痰丸.....  | 1  |
| ◎四方胃胶囊.....    | 3  |
| ◎四方胃片.....     | 6  |
| ◎四红丹.....      | 9  |
| ◎四虎散（剧）.....   | 10 |
| ◎四季菜颗粒.....    | 13 |
| ◎四季菜糖浆.....    | 15 |
| ◎四季感冒片.....    | 17 |
| ◎四季青片.....     | 20 |
| ◎四季三黄丸.....    | 22 |
| ◎四季油(同仁油)..... | 24 |
| ◎四君子袋泡剂.....   | 26 |
| ◎四君子合剂.....    | 30 |
| ◎四君子颗粒.....    | 32 |
| ◎四苓散.....      | 34 |
| ◎四妙丸.....      | 36 |
| ◎四逆散.....      | 38 |
| ◎四神片.....      | 39 |
| ◎四圣散.....      | 41 |
| ◎四时甘和茶.....    | 43 |

|               |     |
|---------------|-----|
| ◎四藤片.....     | 45  |
| ◎四物益母丸.....   | 47  |
| ◎四消丸.....     | 50  |
| ◎四正丸.....     | 53  |
| ◎四制香附丸.....   | 56  |
| ◎嗣育保胎丸.....   | 57  |
| ◎松香.....      | 59  |
| ◎搜风理肺丸.....   | 61  |
| ◎搜风顺气丸.....   | 62  |
| ◎苏冰滴丸.....    | 65  |
| ◎苏菲咳糖浆.....   | 68  |
| ◎苏肝合剂.....    | 70  |
| ◎苏合丸.....     | 73  |
| ◎苏南山肚痛丸.....  | 76  |
| ◎苏子降气丸.....   | 79  |
| ◎速感宁胶囊.....   | 81  |
| ◎速效救心丸.....   | 85  |
| ◎速效牛黄丸.....   | 89  |
| ◎速效心痛滴丸.....  | 94  |
| ◎速效心痛气雾剂..... | 97  |
| ◎速效牙痛宁酊.....  | 101 |
| ◎速效止泻胶囊.....  | 103 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ◎速止水泻冲剂.....    | 105 |
| ◎酸枣仁合剂.....     | 107 |
| ◎酸枣仁糖浆.....     | 109 |
| ◎损伤骨药膏.....     | 111 |
| ◎损伤速效止痛气雾剂..... | 112 |
| ◎损伤止痛膏.....     | 115 |
| ◎缩泉丸.....       | 117 |
| ◎锁精丸(锁精丹).....  | 118 |
| ◎锁阳补肾胶囊.....    | 121 |
| ◎调经白带丸.....     | 124 |
| ◎调经补血丸.....     | 127 |
| ◎调经促孕丸.....     | 130 |
| ◎调经化瘀丸.....     | 133 |
| ◎调经活血片.....     | 135 |
| ◎调经健胃丸.....     | 138 |
| ◎调经丸.....       | 140 |
| ◎调经养血丸.....     | 143 |
| ◎调经益灵片.....     | 145 |
| ◎调经止带丸.....     | 148 |
| ◎调经止痛片.....     | 149 |
| ◎调经至宝丸.....     | 152 |
| ◎调经种子丸.....     | 154 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| ◎调经姊妹丸.....        | 156 |
| ◎调气丸.....          | 158 |
| ◎调胃丹.....          | 159 |
| ◎调胃舒肝丸.....        | 161 |
| ◎调胃消滞丸.....        | 164 |
| ◎调中四消丸.....        | 167 |
| ◎胎宝胶囊.....         | 170 |
| ◎胎产金丸(胎产金丹).....   | 172 |
| ◎胎盘片.....          | 175 |
| ◎太和妙灵丸(太和妙灵丹)..... | 176 |
| ◎太极升降丸.....        | 180 |
| ◎太极丸.....          | 182 |
| ◎太阳膏.....          | 184 |
| ◎痰喘半夏颗粒(冲剂).....   | 185 |
| ◎痰净片.....          | 188 |
| ◎痰咳清片.....         | 192 |
| ◎痰饮丸.....          | 193 |

## ◎顺气消食化痰丸

拼音名：Shunqi Xiaoshi Huatan Wan

标准编号：WS3-B-1796

### 【处方】

半夏 (制)480g 青皮 (炒) 30g 紫苏子 (炒)  
30g胆南星 480g 陈皮 (制) 30g 莱菔子 (炒)  
30g沉香 30g 麦芽 (炒) 30g 漳州神曲 (炒)30g  
生姜 30g 山楂 (炒) 30g 葛根 30g苦杏仁  
30g 香附 (醋炒)30g

### 【制法】

以上十四味，除生姜外，其余半夏等十三味粉碎成细粉，过筛，混匀。

取生姜捣汁，加水适量，泛丸，干燥，即得。

### 【性状】

本品为棕褐色的水丸；气微，味苦、微辛。

### 【鉴别】

取本品，置显微镜下观察：外果皮细胞断面观极

扁平，具钩状增厚壁，表面观呈类椭圆形，壁见致密雕花状纹。

纤维管胞大多成束，较细长，壁稍厚，木化，径向壁有具缘纹孔，纹孔口相交成人字形或十字形，也有短缝状，长度超出纹孔缘，切向壁上具缘纹孔少见，有的表面可见不规则斜裂纹。

石细胞单个散在或连接成行，侧面观大多呈贝壳形、类圆形、类多角形或梭形，层纹无或极少，纹孔甚密，表面观纹孔大而密。

纤维束周围的细胞大多含草酸钙方晶，形成晶纤维，木化增厚。

叶基纤维红棕色或黄棕色交成束，纤维细长，纤维周围亦可见含硅质的细胞。

种皮栅状细胞成片，横断面观细胞一行，高度不一，外壁及侧壁上部薄侧壁大部及内壁增厚，侧壁中部尤厚，表面观呈类多角形或长多角形，胞间层极细。

### **【检查】**

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录8 页)。

**【功能与主治】**

顺气，消食，化痰。

用于积食不化，胸膈胀闷，气逆不顺，咳嗽痰多，  
酒食生痰。

**【用法与用量】**

口服，一次6~9g，一日1~2次。

**【贮藏】**

密闭，防潮。

◎四方胃胶囊

拼音名：Sifangwei Jiaonang

标准编号：WS3-B-2676

**【处方】**

海螵蛸(去硬壳) 156g 黄连 39g 浙贝母  
78g 川楝子(炒) 78g 苦杏仁 39g 柿霜 39g 吴  
茱萸(盐水制) 20g 沉香 12g 延胡索(醋制) 39g

**【制法】**

以上九味，粉碎成细粉，混匀，制成颗粒，干燥，粉碎，装入胶囊，制成1000粒，即得。

**【性状】**

本品为胶囊剂，内容物为灰黄色细颗粒或粉末；气微，味苦。

**【鉴别】**

(1)取本品，置显微镜下观察：不规则透明薄片或碎块，具细条纹或网状纹理。

淀粉粒卵圆形，直径35~48 $\mu$ m，脐点点状、人字状或马蹄状，位于较小端，层纹细密。

种皮表皮细胞常与红棕色色素层细胞相连，表面观多角形，胞腔不明显，有较密颗粒状纹理。

(2)取本品2粒，内容物加稀盐酸5ml(即产生大量气泡)，浸渍片刻，滤过，滤液用浓氨试液调节pH至中性或碱性，滤过，取滤液2ml，加碳酸钠试液1~3滴，即生成白色沉淀。

(3)取本品6粒，内容物加60%乙醇5ml，浸渍1小

时，时时振摇，滤过，滤液作为供试品溶液。

另取黄连对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录VI B)试验，吸取供试品溶液2 $\mu$ l、对照药材溶液1 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，置氨蒸气预饱和的层板缸内，以苯-醋酸乙酯-甲醇-异丙醇-浓氨试液(6: 3: 1.5: 1.5: 0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的亮黄色荧光斑点。

(4)取吴茱萸对照药材0.5g，照[鉴别](3)项下供试品溶液的制备方法制成对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录VI B)试验，吸取对照药材溶液及[鉴别](3)项下的供试品溶液各5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-醋酸乙酯(8: 2)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%三氯化铝乙醇溶液，置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的黄色荧光斑点。

**【检查】**

应符合胶囊剂项下有关的各项规定(附录 I L)。

**【功能与主治】**

疏肝和胃，制酸止痛。

用于肝胃不和所致胃痛，胃酸过多，消化不良，胃及十二指肠溃疡见上述症候者。

**【用法与用量】**

口服，一次3粒，一日2~3次，或遵医嘱。

**【贮藏】**

密封。

◎四方胃片

拼音名：Sifangwei Pian

标准编号：WS3-B-0911

**【处方】**

海螵蛸 156g 渐贝母 78g 沉香 12g 黄连 39g 川楝子(去皮酒炒) 78g 柿霜 39g 苦杏仁 39g 延胡索(醋制) 39g 吴茱萸(盐水制) 0g

### 【制法】

以上九味，将柿霜溶解于70%糖浆中，其余海螵蛸等八味粉碎成细粉，过筛，混匀，与柿霜糖浆混匀，制成颗粒，干燥，压制成1000片，即得。

### 【性状】

本品为灰黄色的片；气微香，味微苦。

### 【鉴别】

(1)取本品6片，研碎，加60%乙醇5ml，浸渍1小时，时时振摇，滤过，滤液作为供试品溶液。

另取黄连对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取供试品溶液2 $\mu$ l，对照药材溶液1 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，置氨蒸气预饱和的层析缸内，以苯-醋酸乙酯-甲醇-异丙醇-浓氨试液(6:3:1.5:1.5:0.5)为展开剂，

展开, 取出, 晾干, 置紫外光灯(365nm)下检视, 供试品色谱中, 在与对照品药材色谱相应的位置上, 显相同的亮黄色荧光斑点。

(2)取吴茱萸对照药材0.5g, 照鉴别(1)项下供试品溶液的方法制备, 作为对照药材溶液。

照薄层色谱法(附录57页)试验, 吸取对照药材溶液及鉴别(1)项下供试品溶液各5 $\mu$ l, 分别点于同一硅胶G薄层板上, 以正己烷-醋酸乙酯(8:2)为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以5%三氯化铝乙醇溶液, 置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中, 在与对照药材色谱相应的位置上, 显相同的黄色荧光斑点。

### **【检查】**

应符合片剂项下有关的各项规定(附录11页)。

### **【功能与主治】**

制酸止痛。

用于胃痛, 胃酸过多, 消化不良, 胃及十二指肠

溃肠。

**【用法与用量】**

口服，一次3片，一日2~3次。

**【贮藏】**

密封。

◎四红丹

拼音名：Sihong Dan

标准编号：WS3-B-0525

**【处方】**

当归 160g 大黄 160g 地榆(炭) 160g 槐  
花(炭) 160g 当归(炭)100g 大黄(炭) 100g

**【制法】**

以上六味，粉碎成细粉。

过筛，混匀。

每100g粉末加炼蜜140~160g制成大蜜丸，即得。

**【性状】**

本品为黑色的大蜜丸；味苦。

**【检查】**

应符合丸剂项下有关的各项规定(附录8 页)。

**【功能与主治】**

清热止血。

用于吐血、衄血、便血、妇女崩漏下血。

**【用法与用量】**

口服，一次1丸，一日2次。

**【规格】**

每丸重9g

**【贮藏】**

密封。

◎四虎散〔剧〕

拼音名：Sihu San

标准编号：WS3-B-1526

**【处方】**

生天南星 200g 生草乌 200g 生白附子  
200g 生川乌 200g

**【制法】**

以上四味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

**【性状】**

本品为灰白色的粉末；气微。

**【鉴别】**

(1)取本品 1g，加正丁醇 5ml，振摇 5 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加醋酐 0.5ml 使溶解，加硫酸 1 滴，初显紫红色，渐变为绿色。

(2)取本品 2g，加乙醚 40ml，氨试液 0.5ml，振摇 5 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加磷酸 3~4 滴，置小火上微热，显紫堇色 (3)取本品 10g，加乙醚 40ml，氨试液 3ml，放置 30 分钟，时时振摇，分取乙醚液，蒸干，残渣加无水乙醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。

另取乌头碱对照品，加无水乙醇制成每 1ml 含 2mg 的溶液，作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录 57 页)试验，吸取上述两种