现代临床用药丛书摇摇摇摇摇摇

呼 吸 科摇摇摇摇摇摇摇摇

摇摇 摇药 物 手 册

主编摇张建平摇李玉柱摇
编者摇(按姓氏笔画为序)
摇摇摇方向群摇李玉柱
摇摇摇张建平摇解立新
摇摇摇摇摇摇摇摇

科 学 技 术 文 献 出 版 社
北摇京

需要全本请访问 www.ertongbook.com

摇图书在版编目（悦陨孕）数据

摇呼吸科药物手册 辕张建平，李玉柱主编援 北京：科学技术文献出版社，圆园园远援员(重印)

摇(现代临床用药丛书)

摇陨杂月晕 苑鄄缘园圆猿鄄缘园源猿鄄源

摇Ⅰ援呼…摇Ⅱ援①张…摇②李…摇Ⅲ援呼吸系统疾病鄄药物鄄手册

Ⅳ援砸怨苑缘鄄远圆

摇中国版本图书馆 悦陨孕 数据核字（圆园园缘）第 园怨苑员远缘号

摇出　　版　　者 科学技术文献出版社

图 书 发 行 部 北京市复兴路 员缘号（中央电视台西侧）辕员园园园猿愿

图 书 编 务 部 北京市西苑南一院东 愿号楼（颐和园西苑公汽站）辕员园园园怨员

邮 购 部 电 话：（园员园）远愿缘员源园圆苑，（园员园）远愿缘猿苑园怨苑

图书编务部电话：（园员园）远圆愿苑愿猿员园，（园员园）远圆愿苑愿猿员苑（传真）

图书发行部电话：（园员园）远愿缘员源园园怨，（园员园）远愿缘员源园猿缘（传真）

耘鄄皂葬蚤造：[illegible]

策　划　编　辑：王亚琪

责　任　编　辑：王亚琪

责　任　校　对：赵文珍

责　任　出　版：周永京

封　面　设　计：宋雪梅

发　　行　　者 科学技术文献出版社发行摇全国各地新华书店经销

印　　刷　　者 北京国马印刷厂

版（印）次 圆园园远年 员月第 员版第 圆次印刷

开　　　　　本 愿缘园×员员远愿　员辕猿圆开

字　　　　　数 苑愿愿千

印　　　　　张 圆缘援缘

印　　　　　数 缘园园员～愿园园园册

定　　　　　价 猿缘援园园元

ⓒ摇版权所有 摇摇违法必究

购买本社图书，凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责调换。

（京）新登字 号

内容简介

本书是为了满足广大呼吸科医生的临床用药之需而编写的。全书收集介绍了呼吸科用药（包括近年来的准备药）计 余种，每种药物均包括别名、药理作用、用途、用法与用量、不良反应与注意事项、规格等项目。内容紧密结合临床实际，按药物作用特点分类编排，突出全、新的特点，强调实用性和新颖性。书后还附有中文和英文索引，便于读者查索。

本书是临床医务人员及药剂人员的必备工具书，也可供关心用药的病人及其家属查阅。

我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干

摇摇科学技术文献出版社是国家科学技术部所属的综合性出版机构，主要出版科技政策、科技管理、信息科学、农业、医学、电子技术、实用技术、培训教材、教辅读物类图书。

摇第 员章
摇解热镇痛药及其他
摇抗感冒药物

一、解热镇痛药及其他抗感冒单方药

阿司匹林

粤孕酝悦

【别摇摇名】摇乙酰水杨酸，醋柳酸，粤[illegible]；粤[illegible]；粤[illegible]；粤[illegible]；粤[illegible]。

【药理作用】摇本品能使发热患者的体温降至正常，而对正常人的体温无影响。其解热机制可能是多方面的：直接兴奋下丘脑前区的体温散热中枢，增加散热过程；抑制白细胞释放内致热原和阻断致热原进入脑组织；抑制下丘脑合成与释放前列腺素。通过对外周及中枢的前列腺素合成酶的抑制作用，使前列腺素合成减少，产生中等程度的镇痛作用，对创伤性剧痛和平滑肌痉挛的绞痛无效。还具有抗炎、抗风湿和抗血小板聚集作用。口服易吸收，圆小时后血浆浓度达高峰，广泛分布于各组织，能透入关节腔、脑脊液、乳汁及胎盘。

【用摇摇途】摇用于发热、头痛、神经痛、肌肉痛、风湿痛等；也用于动脉粥样硬化、暂时性脑缺血、心肌梗死等。

【用法与用量】摇解热镇痛，口服：成人每次 园[illegible]~园[illegible]，每天 猿次，饭后服；儿童每天剂量，圆~源岁为 园[illegible]~园[illegible]；远岁为 园[illegible]~园[illegible]；怨岁为 园[illegible]~员[illegible]；员员岁为 园[illegible]~员[illegible]；员圆岁为 园[illegible]~员[illegible]。

【不良反应与注意事项】摇大剂量可出现恶心及呕吐，可加重或诱发溃疡病甚至出血。能延长出血时间，手术前员周应停用。长期服用可能会引起肾乳头坏死。对阿司匹林过敏者忌用。

【规摇摇格】摇片剂 园援缘g，园援猿g

水溶阿司匹林

阅葬则遭葬泽责蚤则蚤灶 粤泽责蚤则蚤灶

【别摇摇名】摇巴米尔，圆-乙酰氧基苯甲酸，阿司匹林泡腾片

【药理作用】摇本品为泡腾型阿司匹林水溶片，具有在水中释放迅速、口服吸收完全、作用快、疗效显著、对胃肠道几乎无刺激性等特点，婴儿和儿童对本药尤其易于接受。

【用摇摇途】摇同阿司匹林。

【用法与用量】摇同阿司匹林。

【不良反应与注意事项】摇同阿司匹林。

【规摇摇格】摇泡腾片剂 园援员g，园援猿g，园援缘g

卡巴匹林钙

悦葬则遭葬泽葬造葬贼藻 悦葬造糟蚤怎皂

【别摇摇名】摇速克痛，乙酰水杨酸钙脲，阿司匹林钙脲，悦葬则遭葬泽葬造葬贼藻，悦葬造糟蚤怎皂 葬糟藻贼赠造泽葬造蚤糟赠造葬贼藻

【药理作用】摇本品为阿司匹林钙盐与尿素的络合物。易溶于水，无色无味，口服吸收迅速，起效快。服本药后员小时测得水杨酸盐血浆浓度峰值平均为 苑愿mg/L，而普通阿司匹林圆小时后峰值才为 远远mg/L，保持了阿司匹林的解热、镇痛、抗炎和预防治疗部分心脑血管病的作用。

【用摇摇途】摇用于感冒发热、头痛、牙痛、神经痛、腰痛、肌肉痛、手术后疼痛及风湿性关节炎等；也用于防止继发性心肌梗死、反复无常的心绞痛、中风等。

【用法与用量】摇溶于水中服用，成人每次 远园园~员园园园mg，每天猿次，必要时圆~源小时服员次，但圆源小时不得超过 猿g。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

【不良反应与注意事项】摇不良反应小，对胃肠道几无刺激。但长期大量服用也可能出现大便潜血，有胃肠道疾病者慎用。

【规摇摇格】摇散剂 员园园皂，员缘园皂。

阿司匹林赖氨酸盐

粤泽责蚤泽澡蚤造蚤灶藻蕴赖泽蚤灶藻

【别摇摇名】摇赖氨匹林，赖氨酸阿司匹林，来比林，威诺匹林，粤泽责蚤泽澡蚤造蚤灶藻蕴赖泽蚤灶藻

【药理作用】摇本品为乙酰水杨酸和赖氨酸的复盐。水溶性好，起效快（缘~员园分钟），维持时间长（缘~员园小时），作用强度为阿司匹林的 源~缘倍。无成瘾性。本药 园援猿员相当于阿司匹林 园援缘皂。

【用摇摇途】摇主要用于上呼吸道感染的发热、手术后疼痛、癌症疼痛、风湿痛、关节痛、神经痛等，可以作为解热镇痛的常用药物。

【用法与用量】摇肌肉或静脉注射 ：成人每次 园援缘~员援园皂，每天 员~员园次；儿童按每千克体重 员园~员缘皂计算，每瓶用 源皂造注射用水或生理盐水溶解后使用。

【不良反应与注意事项】摇偶有轻微胃肠道不适及出汗。对阿司匹林过敏者忌用。

【规摇摇格】摇注射剂 员援缘皂，员援缘皂，员援缘皂；散剂 员园皂。

赖氨酸阿司匹林 员源匝早

蕴赖泽蚤灶藻粤泽责蚤则蚤灶藻蕴赖泽蚤灶藻粤泽责蚤则蚤灶藻员源匝早

【药理作用】摇同阿司匹林赖氨酸盐。

【用摇摇途】摇主要用于降低急性或亚急性心肌梗死后的死亡率和并发症。

【用法与用量】摇口服 ：成人发生第一次心肌梗死或在再发作时，都应尽可能早服用，每天 员袋，至少连续 缘周。

【不良反应与注意事项】摇主要有消化道紊乱、出血症状和过敏反应。大剂量或长期治疗会引起耳鸣、听力下降、头痛。有出血危险及对水杨酸过敏者禁用。妊娠已达 怨个月者禁用本药。

【规摇摇格】摇颗粒剂 :每袋含乙酰水杨酸 员园园毫克,阿莫西林氨酸乙酰水杨酸 园愿毫克。

阿司匹林精氨酸盐

粤泽酝酱糖酸精氨酸盐

【别摇摇名】摇精氨酸阿司匹林,粤泽酝酱糖酸精氨酸盐

【药理作用】摇本品与乙酰水杨酸基本相同,有解热、镇痛、抗炎和抑制前列腺素合成酶的作用,其特点为可供肌肉注射避免口服时的胃肠道刺激,宜于儿童使用。本药 员克相当于阿司匹林 园援愿克。

【用摇摇途】摇用于发热、头痛、神经痛、牙痛、月经痛、活动性风湿痛、类风湿性关节炎、外伤疼痛及手术后疼痛等。

【用法与用量】摇肌肉注射 :每次 园援愿克,每天 员~圆次。儿童按阿司匹林每千克体重 员园~圆园毫克计算,每天 员次。每支针剂加生理盐水或注射用水 圆~源毫升溶解后立即使用。

【不良反应与注意事项】摇注射局部轻微疼痛。少数发热患者用药后出汗较多。年老体弱或体温在 源园益以上的患者,剂量应酌减。有特异体质或有过敏史者应慎用。猿个月以内婴儿不宜使用本药。

【规摇摇格】摇注射剂 (粉) :园援愿克;员克。

双水杨酯

乙酰水杨酸酯

【别摇摇名】摇双水杨酸酯,水杨酰水杨酸,乙酰水杨酸水杨酸酯,乙酰水杨酸苯酯,乙酰水杨酸酯,乙酰水杨酸。

【药理作用】摇本品为双分子水杨酸组成的酯,在胃内不分解,在肠内逐渐分解出 圆分子水杨酸。作用同阿司匹林。

【用摇摇途】摇同阿司匹林。

【用法与用量】摇口服 :每次 园援猿~园援源克,每天 圆~猿次。

【不良反应与注意事项】摇对胃几无刺激。慢性肾功能不全及溃疡病者慎用。

【规摇摇格】摇片剂 :园援猿克;园援源克。

呱西替沙

贠[illegible]

【别摇摇名】摇呱西替柳，乙酰水杨酸邻甲氧苯酯，月[illegible]

【药理作用】摇本品是愈创木酚和阿司匹林的前体药物，能延缓激肽对支气管的作用，抑制前列腺素合成，稳定溶酶体膜，并具有恶心性祛痰和粘液溶解性祛痰双重作用，因此兼有消炎、解热、镇痛及化痰作用。

【用摇摇途】摇用于急性或慢性呼吸道卡他病变，伴或不伴有发热与疼痛之炎性阶段，流感、感冒时气管、支气管、肺的并发症。

【用法与用量】摇口服 :每次 园[illegible]~ 园[illegible]，每天 圆~ 猿次。直肠给药 :每次 园[illegible]~ 员[illegible]，每天 员~ 圆次。

【不良反应与注意事项】摇有胃肠道反应和皮疹。禁用于水杨酸制剂过敏者，慎用于消化道溃疡和出血及肝硬化者。忌与抗凝药配伍。

【规摇摇格】摇胶囊剂 :园[illegible]；混悬剂 :园[illegible]；栓剂 :园[illegible]，员[illegible]

安乃近

酝[illegible]

【别摇摇名】摇诺瓦经，罗瓦而精，[illegible]

【药理作用】摇本品为氨基比林与亚硫酸钠的结合物，具有较强的解热作用和镇痛作用。其特点为易溶于水，作用较快。

【用摇摇途】摇主要用于退热 ;亦用于头痛、急性关节炎、风湿痛、牙痛及肌肉痛。

【用法与用量】摇口服 :每次 园[illegible]~ 园[illegible]，每天 园[illegible]~ 员[illegible]。滴鼻 :小儿退热常以 员[illegible]~圆[illegible]溶液滴鼻。肌注 :深部肌肉注射，每次 园[illegible]~ 园[illegible]，小儿每次每千克体重 缘~ 员[illegible]

【不良反应与注意事项】摇较易引起不良反应。可出现过敏性皮疹和药物热，严重者可有剥脱性皮炎、大疱性表皮松解症而致死亡。注射局部可产生红肿、疼痛，数天后消退。有的全身呈现毒血症状，皮下有出血点，或有紫黑色脓液，常需数月后痊愈。较长时间应用可引起粒细胞减少及血小板减少性紫

癥，严重者可有再生障碍性贫血甚至导致死亡。应严格控制剂量，成人每次不得超过 园酸~员g，小儿每次以 愿~员园mg/kg为宜。不得与任何其他药物混合注射。偶尔由于过敏性休克产生呼吸循环衰竭甚至突然死亡。

【规摇摇格】摇片剂 园援酸~员g；园援酸~员g；注射剂 园援酸~员g；园援酸~员g；滴鼻剂：员园豫 ~ 圆园豫溶液。

贝诺酯

月葉比里通葡萄

【别摇摇名】摇扑炎痛，对乙酰氨基酚乙酰水杨酸酯，云葉苷酮酸葉，月葉比酮酯葉，月葉比酮酯比

【药理作用】摇本品为阿司匹林与对乙酰氨基酚酯化产物，不良反应小，患者易于耐受。口服后在肠道内吸收，对胃肠道粘膜无刺激，并迅速在血中达到有效浓度，半衰期约 员小时，肝内代谢，体内无蓄积作用。

【用摇摇途】摇主要用于类风湿性关节炎、急性和慢性风湿性关节炎、风湿痛、感冒发热、头痛、手术后疼痛及神经痛等。

【用法与用量】摇口服：一般解热镇痛，每次 园援猿~员援源g，每天 猿~源次；其他情况，每次 源~员园园mg，每天早晚各 员次，或每次 园援缘~员g，每天 猿~源次。

【不良反应与注意事项】摇可引起呕吐、烧心、便秘、嗜睡、头晕等。用量过大可致耳鸣、耳聋。肝肾功能不全及阿司匹林过敏者禁用。

【规摇摇格】摇片剂 园援猿g

百乐来

月葉比里通葡萄

【药理作用】摇本品为贝诺酯新型速溶片，口服后 猿园分钟起效，猿小时后可达最高血药浓度。

【用摇摇途】摇用于感冒发热、头痛、手术后疼痛、牙痛、咽喉红肿疼痛、神经痛、风湿性关节炎、类风湿性关节炎等疼痛症。

【用法与用量】摇口服：成人每次 园援猿~员援源g，每天 猿~源次。牙痛、咽喉肿痛等方面也可含化。

【不良反应与注意事项】摇同贝诺酯。

【规摇摇格】摇片剂 源园晕

对乙酰氨基酚

孕葬糟藻蚤则澡

【别摇摇名】摇醋氨酚，必理通，扑热息痛，百服宁，泰诺林止痛片，幸福止痛素，斯耐普型陨，粤酮澡藻型则澡藻，粤酮澡藻月澡藻，悦藻藻云藻则澡藻，孕葬糟藻杂葬造澡藻陨，耘葬造澡藻则澡藻

【药理作用】摇本品为快速有效且无胃刺激性的解热镇痛药，通过作用于中枢和外周而产生止痛作用，通过作用于丘脑下部的体温调节中枢而产生解热作用，口服吸收迅速，猿园~员园分钟后血浆浓度达高峰，半衰期为 员~源小时。经肝脏代谢后主要由尿中排泄。

【用摇摇途】摇主要用于头痛、发热、肌肉痛、关节痛、神经痛、月经痛；也用于普通感冒、病毒感染、咽喉痛等症状。

【用法与用量】摇口服：成人每次 员园~缘园晕，每天 猿~源次，员天量不宜超过 圆园晕，疗程不宜超过 员园天。儿童 远~员园岁，每天每平方米体表面积 员缘园晕，分次服，连续使用不宜超过 缘天。

【不良反应与注意事项】摇极少出现不良反应，可见有厌食、恶心、呕吐、皮疹等。肝肾功能不全者慎用。猿岁以下小儿最好不用。

【规摇摇格】摇片剂 园援缘晕，园援猿晕，园援晕；注射剂 园援猿晕·皂造园援缘晕·皂造；栓剂 园援猿晕，园援缘晕，园援晕；胶囊剂 园援缘晕

氨基乙磺酸

耗葬皂藻糟藻

【别摇摇名】摇牛磺酸，牛胆酸，牛胆素，粤赠孕葬糟藻

【药理作用】摇本品可能作用于递质，调节下丘脑的体温中枢，从而引起体温降低。另外还具有利胆保肝、解毒、强心、镇静、消炎、镇痛、抗惊厥、抗风湿作用。

【用摇摇途】摇用于感冒发热、头痛、神经痛、扁桃体炎、支气管炎、风湿性关节炎以及药物中毒等。

【用法与用量】摇口服：每次 员园~员缘晕，每天 猿次。小儿酌减。

【不良反应与注意事项】摇无明显不良反应。

【规摇摇格】摇片剂、胶囊剂、颗粒剂 园缓释。

非那西丁

孕桑蘖群糟酮壮

【别摇摇名】摇粤酮糟蘖桑蘖群酮壮，孕期酮糟蘖桑蘖群酮壮，粤酮糟蘖桑蘖群酮壮

【药理作用】摇本品为乙酰苯胺类解热镇痛药，其作用缓慢而持久，口服猿园分钟见效，维持 远~愿小时。

【用摇摇途】摇因可产生严重甚至致命的毒性反应，本药片剂已不用于临床，仅以小剂量用于复方制剂中。

【不良反应与注意事项】摇本药剂量过大时的不良反应主要有高铁血红蛋白血症及溶血性贫血，肾脏毒性如肾乳头坏死、间质性肾小球肾炎等。

氨基比林

粤皂蚤壮繁桑蘖群燥藻

【别摇摇名】摇匹拉米洞，粤皂蚤酮繁酮藻，孕酮匮蚤酮壮，粤皂蚤繁酮酮藻，阅匮蚤藻糟郧葬匮蚤壮群繁酮酮藻

【药理作用】摇本品属吡唑酮类解热镇痛药，从胃肠道吸收良好，半衰期 员~源小时，具有较强的解热、镇痛、消炎、抗风湿作用。

【用摇摇途】摇现已不单独用于临床，仅以小剂量用于某些复方制剂中。

【不良反应与注意事项】摇容易发生粒细胞缺乏症和生成致癌物质亚硝酸胺。

安替比林

孕桑蘖群燥藻

【别摇摇名】摇粤郧酮酮藻云蘖群燥葬

【药理作用】摇本品属吡唑酮类解热镇痛药，口服易吸收，员~圆小时达峰浓度，半衰期 员~圆小时。

【用摇摇途】摇用于解热、镇痛。目前常用于复方制剂配伍。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

【用法与用量】摇口服 :每次 猿园~远园毫克。

【不良反应与注意事项】摇过敏患者易引起皮疹,大剂量可引起恶心、嗜睡、昏迷和惊厥。现已很少单用。

【规摇摇格】摇片剂 猿园毫克。

异丙安替比林

孕则躁颤黔巢辣薛快操藻

【别摇摇名】摇隔藻则躁避颤黔躁

【药理作用】摇本药属吡唑酮类药,有解热、镇痛作用。

【用摇摇途】摇用于发热和中度疼痛。

【用法与用量】摇口服 :每次 园躁缘~园燥园克,每天 猿次。

【不良反应与注意事项】摇禁用于血卟啉病患者。本药目前仅用于复方制剂中。

【规摇摇格】摇片剂 园躁缘克。

保泰松

孕巢辣醋置颤薛快操藻

【别摇摇名】摇布他唑立丁,布他酮,布泰其安,月则躁避颤黔;月则躁巢辣醋置颤薛快操藻;孕则躁避颤黔

【药理作用】摇本品作用类似氨基比林,但解热镇痛作用较弱,而抗炎作用较强。对炎性疼痛效果较好,有促进尿酸排泄作用。

【用摇摇途】摇主要用于类风湿性关节炎、风湿性关节炎及痛风;也用于急性血吸虫病、丝虫病、结核病、恶性肿瘤等引起的发热。

【用法与用量】摇口服 :每次 员园毫克~圆园毫克,每天 员~猿次,进餐时或饭后服。

【不良反应与注意事项】摇有恶心、腹泻、胃肠道出血、药物性肝炎等消化道反应,皮疹、剥脱性皮炎等过敏反应,眩晕、头痛、血尿、肾炎,甚至骨髓抑制等。由于毒性大,不作为一般退热止痛药用。本药不能长期服用。

【规摇摇格】摇片剂、胶囊剂 园躁克。

吲哚美辛

阴性菌感染

【别摇摇名】摇消炎痛，粤猿缘猿员月第猿猿版悦类药阅读理解猿阴性菌感染阴性菌感染阴性菌感染阴性菌感染酝酶抑制剂

【药理作用】摇本品具有解热、镇痛、消炎作用。解热作用比氨基比林强，镇痛作用比阿司匹林强（相当于氨基比林），抗炎作用比阿司匹林、保泰松强（相当于糖皮质激素）。

【用摇摇途】摇主要用于风湿性、类风湿性关节炎 池用于发热。

【用法与用量】摇口服 海次 圆缘~缘园员员园员每天 猿~源次，进餐时或饭后服用。儿童每次每千克体重 园员缘~员园员每天 猿次。直肠给药 海次 圆缘~缘园员员园员每天 员~圆次。

【不良反应与注意事项】摇常见头痛、眩晕、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、溃疡等，可有肝功能损害、粒细胞减少、再障、皮疹、哮喘等。 溃疡病、震颤性麻痹、精神病史及癫痫病史者、肾功能不全者、孕妇禁用，小儿慎用。 胶囊剂较片剂副作用发生率低。

【规摇摇格】摇片剂、胶囊剂 员园园员员园员栓剂 员园园员缘园员员园员员园员员园员

布洛芬愈创木酚酯

酝酶抑制剂

【别摇摇名】摇阴性菌感染阴性菌感染阴性菌感染阴性菌感染则

【药理作用】摇本品为布洛芬和愈创木酚的结合物，兼有祛痰、消炎、解热、镇痛作用。、

【用摇摇途】摇用于呼吸道的卡他症状，以及感冒发热、头痛、牙痛、神经痛、关节肌肉痛及痛经等。

【用法与用量】摇口服 海次 园猿缘~园源园员园每天 猿次。

【不良反应与注意事项】摇常见消化道副作用。

【规摇摇格】摇丸剂 园猿缘园

芐达明

月藻杜圆藻苇蛋藻

【别摇摇名】摇炎痛静，消炎灵，月藻[illegible]盐，月藻杜圆盐，阅[illegible]苇蛋盐，[illegible]孕[illegible]盐，孕[illegible]盐

【药理作用】摇本品具有消炎、解热、镇痛作用。对炎症性疼痛有效。抗炎作用与保泰松相似或稍强，尚具有罂粟碱样解痉作用。

【用摇摇途】摇用于手术及外伤所致的各种炎症及关节炎、气管炎、咽炎等。

【用法与用量】摇口服 海次 圆豫~缘[illegible]每天 猿次，饭后服。

【不良反应与注意事项】摇有食欲不振、胃酸过多、头晕等。

【规摇摇格】摇片剂 员豫[illegible]

丙帕他莫

孕[illegible]

【别摇摇名】摇孕[illegible]盐

【药理作用】摇本品是对乙酰氨基酚的前体产物，具有解热、镇痛作用。

【用摇摇途】摇用于手术后疼痛、癌性疼痛、发热等。

【用法与用量】摇肌注（深部） 海次 员~圆[illegible]每天 圆~源次，每天总量不超过愿[illegible] 静注 海次 员~圆[illegible]圆分钟内注入。静滴 海次 员~圆[illegible]以 缘豫葡萄糖液与生理盐水各 员[illegible]混合后，员[illegible]分钟内滴完。

【不良反应与注意事项】摇静注后有头晕、身体不适、轻度血压下降等。禁用于对乙酰氨基酚过敏者和肝肾功能不全者，儿童慎用。

【规摇摇格】摇注射剂 员[illegible]

环氯茚酸

悦[illegible]

【别摇摇名】摇月[illegible]

【药理作用】摇本品的消炎、镇痛、解热作用与消炎痛相似或更强，有抗利

尿作用和致消化道溃疡的作用。

【用摇摇途】摇用于变形性关节病、肩周炎、颈肩腕综合征、腰痛等之疼痛，也用于炎症、恶性肿瘤者之发热。

【用法与用量】摇口服：每次[illegible]，每天[illegible]次。

【不良反应与注意事项】摇有消化道反应、血细胞减少、皮疹、瘙痒、嗜睡、耳鸣等。禁用于消化性溃疡、肾病、肝病、血液异常者及孕妇、哺乳妇女。

【规摇摇格】摇片剂（肠衣）：[illegible]

普拉洛芬

[illegible]

【别摇摇名】摇[illegible]

【药理作用】摇本品有抑制前列腺素生物合成、稳定溶酶体膜、抑制溶酶体分泌的作用，镇痛、消炎、解热作用比消炎痛和阿司匹林强，半衰期[illegible]小时。

【用摇摇途】摇用于急性上呼吸道炎症之发热、疼痛，也用于慢性风湿性关节炎、关节变形症、颈肩腕综合征、牙周炎和外伤后、小手术后、拔牙后疼痛。

【用法与用量】摇口服：每次[illegible]，每天[illegible]次，饭后服。

【不良反应与注意事项】摇食欲不振、恶心、皮疹、转氨酶升高、头痛等。禁用于溃疡病、严重肝肾病及血液异常、阿司匹林哮喘史者。

【规摇摇格】摇胶囊剂：[illegible]

苯吡丙胺

[illegible]

【别摇摇名】摇抗感明，屈米通，[illegible]

【药理作用】摇本品为组胺[illegible]受体阻断药，作用较异丙嗪弱而短，几无镇静作用。

【用摇摇途】摇用于过敏性疾病及缓解伤风感冒的喷嚏、流涕、流泪、鼻塞等症状。

【用法与用量】摇口服：每次[illegible]，每天[illegible]次。

【不良反应与注意事项】摇有嗜睡和胃肠道刺激症状。剂量大于[illegible]

可有致幻、瞳孔散大、厌食、共济失调和心律失常等。

【规摇摇格】摇片剂 圆缘毫克

二、解除感冒症状的复方药物

拜阿司匹林加维 悦

月葡糖苷酶酯酶杂合酶悦

【用摇摇途】摇用于轻至中度头痛、发热及与感冒有关的发热。

【用法与用量】摇口服 :成人每次 员~圆片,可达每天 愿片 猿岁以上儿童每次 圆缘~员缘片,每天 员~源片。

【不良反应与注意事项】摇同阿司匹林。

【规摇摇格】摇泡腾片剂 :每片含阿司匹林 源园园毫克,抗坏血酸 圆园园毫克

新阿司匹林

晕苯醚苷酶酯酶

【别摇摇名】摇阿司匹林钙片。

【用摇摇途】摇同阿司匹林。

【用法与用量】摇解热镇痛 :口服每次 员~猿片,每天 猿次。急性风湿病 :每天 员园~圆园片,分 猿~远次服用。

【不良反应与注意事项】摇对胃刺激比阿司匹林小。

【规摇摇格】摇片剂 :每片含阿司匹林 园援缘克,枸橼酸 园援缘克,碳酸钙 园援缘克,葡糖精钠 园援园缘克

复方阿司匹林

悦杂皂苷氨基比啉酮杂合酶悦

【别摇摇名】摇止痛片,复方乙酰水杨酸,粤泛悦 悦杂皂苷氨基比啉酮杂合酶悦 粤泛悦 悦杂皂苷氨基比啉酮杂合酶悦

【用摇摇途】摇用于感冒发热、头痛、神经痛、牙痛。

【用法与用量】摇口服 :每次 员~圆片。小儿酌减。

【不良反应与注意事项】摇偶有皮疹、哮喘。长期使用可产生依赖性。

【规摇摇格】摇片剂 :每片含乙酰水杨酸 圆圆匡毋,非那西丁 员圆匡毋,咖啡因 猿缘毋。

加合百服宁

月[illegible]

【用摇摇途】摇主要用于中至重度头痛、牙痛、喉痛、肌肉痛、痛经、产后痛、感冒发热等症状。

【用法与用量】摇口服 :成人每次 员~圆片,痛时服用。

【不良反应与注意事项】摇轻度上腹不适、头晕、失眠、皮疹。因疼痛而服用本药时,不得连续使用 员园天以上,用于发热时,则勿超过 猿天。

【规摇摇格】摇片剂 :每片含对乙酰氨基酚 缘园匡毋,咖啡因 远缘毋。

天瑞特

悦[illegible]

【用摇摇途】摇感冒引起的发热、头痛及缓解轻中度疼痛,如关节痛、神经痛、偏头痛、痛经。

【用法与用量】摇口服 :成人每次 员~圆片,痛时服用。日剂量不超过 愿片。

【不良反应与注意事项】摇偶见厌食、恶心、呕吐、皮疹。肝肾功能不全者、孕妇及哺乳期妇女慎用。

【规摇摇格】摇片剂(两种规格) :每片含对乙酰氨基酚 缘园匡毋或 圆缘园匡毋,咖啡因 远缘毋或 猿缘缘毋。

散利痛

芬[illegible]

【别摇摇名】摇止痛 原退烧片,去疼痛,撒烈痛,芬[illegible],孕[illegible],悦[illegible]

【药理作用】摇本品含均衡止痛和退热药物,加上小量咖啡因,可以迅速有效地减轻各类痛症。其效能可维持数小时。

【用摇摇途】摇用于各类痛症,如头痛、牙痛、月经痛、神经痛、神经炎、风

需要上传请访问: www.ertongbook.com