中华医学全集

基素及其有关药物（三）

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目录

◎ ◎丁氯倍他松 Clobetasone Butyrate....2
◎ 二氟可龙 Diflucortolone〔1〕.....3
◎ 氟米龙 Fluorometholone〔1〕.....3
◎ 氟氢可的松 fludrocortisone.....6
◎ 氟氢缩松 Fludroxycortide〔1〕.....8
◎ 氟轻松 Fluocinolone Acetonide.....8
◎ 哈西奈德 Halcinonide.....10
◎ 甲泼尼龙 Methylprednisolone〔1〕.....11
◎ 甲羟松 Medrysone〔1〕.....13
◎ 可的松 Cortisone.....13
◎ 卤米松 Halometasone〔1〕.....15
◎ 氯倍他索 Clobetasol.....16
◎ 氯泼尼醇 Cloprednol〔1〕.....18
◎ 美替拉酮 Metyrapone〔1〕.....19

◎ 莫米松 Mometasone〔I〕.....20
◎ 培他米松.....20
◎ 泼尼松 Prednisone.....22
◎ 泼尼松龙 Prednisolone.....25
◎ 氢化可的松 Hydrocortisone.....27
◎ 氢化可的松琥珀酸钠.....31
◎ 去羟米松 Desoximetasone〔I〕.....40
◎ 去氧皮质酮 Desoxycortone.....41
雌激素及其类似合成.....42
◎ 倍美安.....42
◎ 倍美盈片剂.....60
◎ 苯甲酸雌二醇 Estradiol Benzoate.....79
◎ 苯甲酸雌二醇注射液.....80
◎ 丙酸己烯雌酚 Diethylstilbestrol Dipropionate.....84
◎ 雌二醇 Estradiol.....84
◎ 雌三醇 Estriol〔I〕.....88

◎ 共轭雌激素阴道软膏.....92
◎ 环戊丙酸雌二醇 estradiol cypionate 95
◎ 己烷雌酚 Hexestrol〔1〕.....96
◎ 己烯雌酚 Diethylstilbestrol.....97
◎ 甲乙烯雌酚 Dimestrol.....100
◎ 氯烯雌醚 Chloritrianisene.....101
◎ 美雌醇 Mestranol〔1〕.....103
◎ 尼尔雌醇 Nilestriol.....104
◎ 普鲁雌醚 Promestriene.....106
◎ 炔雌醇 Ethinylestradiol.....107
◎ 炔雌醚 Quinestrol.....109
◎ 妊马雌酮 Conjugated Estrogens.....111

◎ 用药须知在重组溶液前应保存于冰箱内。可溶于按1∶1配制的生理盐水和10%葡萄糖溶液。不能与水解蛋白、抗坏血酸(维生素C)或其他酸性溶液相配制。重组溶液立即使用：用5 mL的灭

菌注射用水(USP)稀释，配成约 5 mL，使成 5 mg/mL 的浅黄色溶液。稀释液应缓慢加入，使其冲击瓶壁。温和地摇动，不要剧烈震荡。　　多次使用：用 5 mL 灭菌注射用水(USP)稀释，其余按上述方法操作，该溶液为 5 mg/ mL 的重组溶液。一般不推荐将本药与其他药物同时输注。然而在急诊时，出于权宜之计，当已经开始输液时，将其注入输液针头近端的输液管中也非不可取。但此时，必须考虑输液的配伍禁忌。 116

◎ 戊酸雌二醇 Estradiol Valerate.....121

◎ 戊酸雌三醇.....122

◎ 溴醋己烷雌酚 Hexestrol Dibromoacetate 129

促进腺激素.....130

◎ 布舍瑞林 Buserelin〔I〕 130

◎ 戈那瑞林 Gonadorelin〔I〕 131

◎ 戈舍瑞林 Goserelin〔I〕 134

需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎ 枸橼酸氯米芬.....135
◎ 亮丙瑞林 Leuprorelin〔1〕.....139
◎ 氯米芬 Clomifene.....140
◎ 那法瑞林 Nafarelin〔1〕.....143
◎ 尿促性素 Menotrophin.....144
◎ 绒促性素 Chorionic Gonadotrophin....152
雄激素及同化激素.....155
◎ 苯丙酸诺龙 Nandrolone Phenylpropionate.....155
◎ 丙酸睾酮 Testosterone Propionate..158
◎ 醋酸环丙孕酮.....161
◎ 醋酸氯司替勃 Clostebol Acetate〔1〕.168
◎ 达那唑 Danazol 169
◎ 达那唑胶囊.....172
◎ 睾酮 Testosterone〔1〕.....178
◎ 庚酸睾酮 Testosterone Enanthate〔1〕 179

◎ 癸酸南诺龙 Nandrolone Decanoate〔I〕 180
◎ 甲睾酮 Methyltestosterone.....181
◎ 葵酸诺龙.....184
◎ 美雄诺龙 Mestanolone〔I〕 185
◎ 羟甲烯龙 Oxymetholone〔I〕 186
◎ 去氢甲睾酮 Metandienone〔I〕 188
◎ 十一酸睾酮 TestosteroneUndecanoate〔I〕 191
◎ 司坦唑醇 Stanozolol.....193
◎ 替勃龙.....195
孕激素类.....197
◎ 环丙孕酮 Cyproterone〔I〕 197
◎ 黄体酮 Progesterone.....199
◎ 己酸羟孕酮.....203
◎ 甲羟孕酮 Medroxyprogesterone.....206
◎ 普美孕酮 promegestone〔I〕 209

◎ 炔孕酮 Ethisterone.....211
胰岛激素及其他影响血.....213
◎ 阿卡波糖 Acarbose〔1〕.....213
◎ 半慢胰岛素锌混悬液 semilente insulin zinc suspensson.....216
◎ 苯乙双胍 Phenformin.....217
◎ 吡格列酮.....220
◎ 醋磺己脲 Acetohexamide〔1〕.....225
◎ 单组分人胰岛素 Human Monocomponent Insulin.....226
◎ 单组分猪胰岛素 Actrapid Monocomponent Insulin.....228
◎ 低精蛋白胰岛素 Isophane Insulin〔1〕 229
◎ 伏格列波糖.....231
◎ 复方盐酸二甲酸胍.....236
◎ 高血糖素 Glucagon〔1〕.....237

◎ 格列本脲 Glibenclamide.....239
◎ 格列吡嗪 Glipizide〔I〕.....244
◎ 格列波脲 Glibornuride〔I〕.....247
◎ 格列喹酮 Gliquidone〔I〕.....248
◎ 格列美脲.....250
◎ 格列嘧啶 Glymidine.....263
◎ 格列齐特 Gliclazide〔I〕.....264
◎ 缓释格列吡嗪.....267
◎ 甲苯磺丁脲 Tolbutamide.....273
◎ 甲钴胺.....277
◎ 精蛋白锌胰岛素注射液 Protamine Zinc Insulin Injection.....279
◎ 氯磺丙脲 Chlorpropamide.....280
◎ 慢胰岛素锌混悬液 lente insulin zinc suspension.....286
◎ 那格列奈.....287
◎ 人胰岛素.....290

◎ 瑞格列奈.....292
◎ 特慢胰岛素锌混悬液 ultralente insulin zinc suspension.....297
◎ 文迪雅.....298
◎ 盐酸苯乙双胍.....303
◎ 盐酸二甲双胍.....305
◎ 依帕司他 epalrestat〔1〕.....311
◎ 胰岛素 Insulin.....313
◎ 胰岛素注射液.....319
◎ 中性胰岛素注射液 Neutral Insulin Injection.....328
◎ 珠蛋白锌胰岛素 globin zinc insulin 336
◎ 白金降脂丸.....339
◎ 防风通圣散.....340
◎ 芬氟拉明 Fenfluramine.....341
◎ 芬普雷司 Fenproporex〔1〕.....343

◎ 减肥茶.....344
◎ 美芬雷司 Mefenorex〔I〕.....346
◎ 轻身减肥片.....347
◎ 右苯丙胺 Dexamfetamine〔I〕.....347
◎ 右芬氟拉明 Dexfenfluramine〔I〕.....349

需要全本请访问 www.ertongbook.com

激素及其它药物

◎ 丁氯倍他松Clobetasone Butyrate

（丁氯倍氟松）

为两酸氯倍他索的丁酸替代物

【性状】

本品为白色或微黄色结晶性粉末，无臭，无味。易溶于氯仿，微溶于乙醇，几不溶于水。遇光易变色。

【药理及应用】

局部外用治疗先天性过敏性皮炎，面部、颈部、腋窝、会阴部湿疹等。以软膏涂于患处，1 日 1～3 次。

【注意】

（1）可引起局部刺激感、瘙痒、痤疮、汗疹、白癣等，应及时停用。

（2）大量或长期大面积应用，可出现糖皮质激素类的不良反应（参见 2.5）。

【制剂】

软膏：0.05%。

◎ 二氟可龙 Diflucortolone〔I〕

【制剂】

霜剂或软膏：0.1%～0.3%

【药理及应用】

为含氟的肾上腺皮质激素类，外用抗炎较氯轻松为好，用于各种需要皮质激素治疗的皮肤疾患外用涂患处

◎ 氟米龙 Fluorometholone〔I〕

(Oxylone)

【分子式成分】

每毫升滴眼剂含1 mg氟米龙、14 mg液膜成份(聚乙

烯乙醇)、40 μg氯化苯烷铵及依地酸二钠、氯化钠、一价磷酸钠、聚氧乙烯山梨醇脂、肪酸脂(表面活性剂)和纯净水。

【制剂规格】

滴眼剂0.1 %

【药理毒理】

本药可抑制具有机械、化学或免疫特性等刺激因子所致的炎症，其作用机理不明确，但一般认为，皮质类固醇可诱导磷酸脂酶A2的抑制蛋白(即脂皮质素)，这些抑制蛋白是通过抑制炎症介质如前列腺素和白三烯的共同前体花生四烯酸的释放，进而控制其炎症介质的生物合成。另外，本药对眼压的影响比地塞米松小。

【适 应 证】

对糖皮质激素敏感的睑球结膜、角膜及其它眼前段组织的炎症。

【不良反应】

长期使用可能引起眼压升高，甚至青光眼。偶致视神经损害，后囊膜下白内障，继发性眼部感染，眼球穿孔和延缓伤口愈合。

【用法用量】

滴眼 ：1-2滴/次，每日2-4次，治疗开始的24-48小时可酌情增加至每小时2滴，应逐步减量停药。

【注意事项】

急性单纯疱疹病毒性角膜炎，眼组织的真菌感染，牛痘及水痘感染，病毒性角膜和结膜感染，结核。对该药成份过敏者禁用。

长期眼部使用糖皮质激素可能导致真菌感染，角膜溃疡者尤甚。治疗期间，应常测眼内压。有单疱病毒感染病史者、眼部急性化脓性感染者、2岁或以下儿童及孕妇慎用。

【生产单位】

眼力健(杭州)制药有限公司Allergan Pharmaceutical

◎ 氟氢可的松 fludrocortisone

(florinef)

为氢化可的松的c_9位f的衍生物。

【性状】

常用其醋酸酯，为白色或微黄色的结晶性粉末；无臭，无味；有引湿性。在乙醇或氯仿中略溶，在乙醚中微溶，在水中不溶。

【药理及应用】

糖代谢及抗炎作用较氢化可的松强，为氢化可的松的15倍，但钠潴留作用为氢化可的松的百倍以上，在原发性肾上腺皮质功能减退症中，可与糖皮质类固醇一起用于替代治疗。也适用于低肾素低醛固酮综合征和植物神经病变所致体位性低血压等。因本品内服易致

需要全本请访问 www.ertongbook.com