家庭常备药物应用指南（四）

于猛 编著

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　　录

来自中草药的祛痰镇咳药 1
艾叶油 1
百咳灵片 1
杜鹃素 Farrerol 2
复方桔梗片 3
复方枇杷糖浆 3
甘草流浸膏 ExtractumGlycyrrhizaeLiquidum 4
獐菜素 Rorifon 4
桔梗 5
咳嗽糖浆 6
咳停片 6
罗汉果止咳露 6
麻杏黄甘片 7
牡荆油 7
木犀草素 Luteolin 8
枇杷止咳露 8
热参 9
伞花烃 p-Cymene 9
痰咳净 10
小儿止咳糖浆 10
哮喘片 11
新碧桃仙片 11
止咳糖浆 11
紫花杜鹃甲素 Matteucinol 12
异丙东莨菪碱 12
异丙托溴铵 Ipratropine 13

奥西那林 Orciprenaline 14
比托特罗 Bitolterol 15
吡布特罗 Pirbuterol 15
丙卡特罗 Procaterol 16
非诺特罗 Fenoterol 17
芬司匹利 Fenspiride 18
富马酸福莫特罗 18
海索那林 Hexoprenaline 20
甲氧那明 Methoxyphenamine 21
克仑特罗 Clenbuterol 21
利米特罗 Rimiterol 23
硫酸沙丁胺醇 24
硫酸特布他林 26
硫酸异丙肾上腺素 28
氯丙那林 Clorprenaline 30
麻黄碱 Ephedrine 31
瑞普特罗 Reprotero1 33
沙丁胺醇 Salbutamol 33
沙美特罗 Salmeterol 35
特布他林 Terbutaline 36
妥洛特罗 Tulobuterol 37
盐酸丙卡特罗 39
盐酸克仑特罗 40
盐酸氯丙那林 41
异丙肾上腺素 Isoprenaline 42
丙酸倍氯米松 44
奈多罗米 Nedocromil 46
曲尼司特 Tranilast 47

噻拉米特 Tiaramide 48
色甘酸钠 SodiumCromoglicate 48
色羟丙钠 51
酮替芬 Ketotifen 51
托普司特 Zaprinast 53
氨茶碱 Aminophylliye 53
茶碱 Theophylline 56
胆茶碱 60
二羟丙茶碱 Diprophylline 60
复方茶碱片 61
甘氨酸茶碱钠 TheophyllineSodiumGlycinate 61
倍氯米松 Beclomethasone 61
布地奈德 Budesonide 63
葆乐辉 Protheo 63
吡嘧司特钾 Pemirolastpotassium 68
博力康尼都保 TerbutalineSulphate 69
喘康速 TerbutalineSulphate 70
达复啉 doxofylline 71
二羟丙茶碱栓 Diprophylline 72
二羟丙茶碱注射液 Diprophylline 73
核酪注射液 74
氢溴酸非诺特罗 FenoterolHydrobromide 74
沙美特罗气雾剂 Salmeterol 76
茶碱缓释片 77
顺尔宁 MontelukastSodium 77
盐酸曲托喹酚 79
盐酸去氯羟嗪 80
盐酸妥洛特罗 80

扎鲁司特 zafirlukast 81
阿桔片 85
奥昔拉定 Oxeladin 86
苯丙哌林 Benproperine 86
苯佐那酯 Benzonatate 88
布他米酯 Butamirate 89
臣功华芬 89
地布酸钠 SodiumDibunate 89
地美索酯 Dimethoxanate 90
二氧丙嗪 Dioxopromethazine 90
福尔可定 Pholcodine 91
福米诺苯 Fominoben 92
复方甘草 92
复方可待因溶液 93
复方岩白菜素 93
枸橼酸喷托维林 94
可待因 Codeine 95
磷酸苯丙哌林 96
磷酸可待因 97
氯苯达诺 Clofedanol 100
氯丁替诺 Clobutinol 101
氯哌斯汀 Cloperastine 101
那可丁 Noscapine 102
那可丁片 102
哌美立特 Pemerid 103
喷托维林 Pentoxyverine 103
匹考哌林 Picoperine 104
普罗吗酯 Promolate 105

需要全本请访问 www.ertongbook.com

普诺地嗪 Prenoxdiazin 106
齐培丙醇 Zipeprol 106
羟蒂巴酚 107
羟蒂巴酚 Drotebanol 107
氢溴酸右甲吗喃，美沙芬 108
替培啶 Tipepidine 109
消刻片 109
盐酸二氧丙嗪 110
依普拉酮 Eprazinone 111
异米尼尔 Isoaminile 112
右美沙芬 Dextromethorphan 112
止咳酮 Antitussone 113
左丙氧芬 Levopropoxyphene 114
半胱甲酯 Mecysteine 114
碘化钾〔典〕PotassiumIodide..... 115
氯化铵 Ammoniumchloride 119
舍雷肽酶 120
羧甲司坦 Carbocisteine 121
细辛脑 Asarone 122
溴已新 Bromhexine 122
盐酸氨溴索 123
盐酸溴己新 125
乙酰半胱氨酸 Acetylcysteine 126
愈创甘油醚 Guaifenein 127
愈创木酚磺酸钾 Sulfoguaiacol 128

来自中草药的祛痰镇咳药

艾叶油

本品为菊科植物艾（Artemisiaargyi）的干叶或鲜叶中所含挥发油，其主要有效成分为蒲品烯醇-4（Terpinenol-4）与α-萜品烯醇（α-Terpineol）。

【药理及应用】本品及萜品烯醇-4 和α-萜品烯醇均能直接松弛气管平滑肌，对抗原、乙酰胆碱和组胺诱发的气管平滑肌痉挛和哮喘均有保护作用。还具有抗过敏作用，可抑制致敏肺组织释放过敏的慢反应物质（SRS-A），并能拮抗 SRS-A 和 5-羟色胺的作用。亦具有一定的祛痰、镇咳作用。对心脏无兴奋作用。用于支气管哮喘和哮喘型慢性支气管炎。

【用法】口服，每次2丸，1日3次。治疗慢性支气管炎时，10日为1疗程，可连续用药2～4疗程。

【注意】少数患者服后有咽干、恶心、胃部不适、头昏等反应，一般不需处理，可自行消失。

【制剂】胶丸：每粒含艾叶油0.75ml。

百咳灵片

【主要成分】由猪、牛、羊或家禽的胆汁制成

【应用】百日咳

【用法】每岁1次1片，10岁以上，每次10～15片，1日3次

杜鹃素 Farrerol

本品为杜鹃科植物满山红（兴安杜鹃，Rhododendrondauricum）所含祛疾有效成分，已能人工合成。

【性状】黄色结晶性粉末，无臭，无味。熔点229～232℃。不溶于水，溶于乙醇、乙醚，易溶于丙酮。

【药理及应用】本品具有粘痰溶解作用，用后可使痰内酸性粘多糖断裂，痰的粘滞性降低，痰液变稀，易于咯出。因此，痰量逐渐减少，咳嗽亦减轻。本品尚能促进呼吸道纤毛运动，并有抗炎症作用。主要用于慢性支气管炎及其他痰多咳嗽。

【用法】口服，每次50～100mg，1日3次。

【注意】

（1）有轻微口干及胃肠道反应。

（2）长期大量用药可致血清丙氨酸氨基转移酶升高，有肝病史及肝功能不全者慎用。

【制剂】片剂：每片50mg。

附：其他满山红制剂

满山红片：每片含杜鹃挥发油2.5mg，每次服2～3片，1日3次。

消咳喘糖浆：为满山红粗提取物的糖浆剂，每瓶

100ml，内含镇咳有效成分杜鹃酮（Germacrone）和杜鹃素。有祛疾镇咳作用，用于慢性支气管炎等疾多、咳嗽。口服，每次7～10ml，1日3次。

复方满山红肢囊：每粒含满山红挥发油（包括杜鹃酮）15mg、满山红总黄酮（包括杜鹃素）25mg、远志皂甙50mg、刺五加醇浸膏35mg。本品有止咳、祛痰作用，并能增强机体抵抗力。用于急慢性支气管炎、轻度肺气肿等引起的咳嗽、多痰。

复方桔梗片

（不含阿片）

【主要成分】桔梗、远志、款冬花、甘草流浸膏、苯甲酸钠

【应用】镇咳、祛痰

【用法】每次3～4片，1日3次

复方枇杷糖浆

【主要成分】枇杷叶、麻黄、甘草、桔梗、紫苑、苦杏仁、芦根

【应用】祛痰、止咳

【用法】每次5～10m1，1日3次

甘草流浸膏 ExtractumGlycyrrhizaeLiquidum

豆科植物甘草（Glycyrrhizauralensis）的根和根茎经乙醇提取、浓缩制得。

【性状】棕色或红褐色液体；味甜、略苦、涩。

【药理及应用】为粘膜保护性镇咳药，可盖在发炎的咽部粘膜上，减少局部感觉神经末梢所受刺激，从而发挥镇咳作用。用于上呼吸道感染、急性支气管炎，具有止咳、祛痰作用。常与其他镇咳、祛痰药制成复方制剂应用。

【用法】口服，每次2～5ml，1日3或4次。

【制剂】复方甘草合剂（布朗合剂，Brownmixtrure）：每瓶500ml内含甘草流侵膏60ml、酒石酸锑钾0.12g、复方樟脑酊60ml、亚硝酸乙酯醑15ml、甘油60ml及蒸馏水适量。有镇咳、祛痰作用。用于上呼吸道感染和急性支气管炎初期。口服，每次5～10ml，1日3次。本品放置后可有少量沉淀，服前应摇匀。

复方甘草片（布朗氏合剂片）：每片含甘草浸膏100mg、阿片粉1.8mg、酒石酸锑钾1mg、樟脑2mg、八角茴香油0.002ml。作用与应用同复方甘草合剂。口服，每次2片，1日3次。本品极易吸湿，应密封置干燥处保存。

菜素 Rorifon

本品为十字花科植物（江剪刀草；Roripaindica；R.montana）的有效成分，已能人工合成。对本品进行结构改造，用羧基取代氰基后，疗效不变，但毒性大减。

【性状】为白色长柱状结晶，熔点45～46℃。难溶于冷水，易溶于氯仿、苯等有机溶剂中。

【药理及应用】祛疾作用较强，镇咳作用次之，平喘作用微弱。用于慢性支气管炎，可使痰量减少，咳喘减轻。

【用法】口服，每次100mg，1日3次，10～20日为1疗程。

【注意】可见口干、食欲不振、胃部不适、恶心、思睡、头晕、排尿困难等副作用。

【制剂】片剂：每片25mg；100mg。

桔梗

为桔梗科植物桔梗（Platycodongrandiflorum）的根，其有效成分为桔梗皂苷。

【药理及应用】为恶心胜祛痰药。口服后可刺激胃粘膜，引起轻度恶心，通过迷走神经反射地引起呼吸道腺体分泌增加，使痰液变稀，易咯出。用于慢性支气管炎及其他有疾的咳嗽。多与其他药物配成复方应用。

【制剂及用法】桔梗流浸膏（FluidextractPlatycodon）：棕黄色液体。每瓶500ml相当于桔梗500g。口服，每次1～2ml，1日3次。

阿桔片〔典〕（CompoundPlatycodonTablets）：每片含桔梗粉90mg、硫酸钾180mg、阿片粉30mg（相当于含无水吗啡2.7～3.3mg）。有镇咳、祛痰作用。有成瘾性，不应长期使用。严重肝功能不全、肺源性心脏病、支气管哮

需要全本请访问 www.ertongbook.com

喘、婴儿及哺乳期妇女禁用。口服，每次1～2片。按麻醉药品管理。

咳嗽糖浆

【主要成分】桑白皮流浸膏、沙参流浸膏、紫苑流浸膏、桔梗流浸膏、贝母流浸膏、薄荷脑等

【应用】祛痰、止咳

【用法】每次4～8ml，1日3～4次

咳停片

（复方贝母片）

【分子式成分】氯化铵，贝母流浸膏，桔梗流浸膏，甘草流浸膏，远志流浸膏，碳酸钙，甘草浸膏，八角茴香油

【制剂规格】薄膜衣片

【药理毒理】止咳和感冒药

【适应证】咳嗽多痰及支气管炎。

【用法用量】1-2片tid-qid。

【生产单位】

浙江康恩贝集团制药有限公司

罗汉果止咳露

【主要成分】罗汉果、百部、白前、桑白皮、枇杷叶、

桔梗

【应用】祛痰、止咳

【用法】每次10～15㎖1，1日3次

麻杏黄甘片

【主要成分】麻黄碱、杏仁苷、黄芩素、甘草酸铵、银杏叶、异丙嗪

【应用】支气管哮喘、哮喘型支气管炎

【用法】每次2片，1日3次

牡荆油

本品是从马鞭草科植物牡荆（Vitexnegundovarcannabifolia）的鲜叶和果实中提得的挥发油，主要含β-丁香烯、α-菠烯、柠檬烯、1，8-桉叶素等成分。

【药理及应用】祛痰、镇咳作用较强，亦有较弱平喘作用。主要用于慢性支气管炎，可使痰液变稀，痰内中性白细胞和嗜酸性白细胞明显减少，纤毛柱状上皮细胞亦减少，变性坏死程度明显减轻，均提示本品尚有一定的抗炎、抗过敏和促进气管、支气管粘膜上皮病变组织修复的作用。

【用法】口服，每次20～40mg，1日3次。

【注意】部分患者初用药时有口干、咽燥、胃部不适和头晕等反应，用药数日后即自行消失，不需停药。

【制剂】胶九：每粒20mg。

荆条油丸：荆条油是从牡荆同属植物荆条中提得，其作用和应用同牡荆油胶丸。每丸含荆条油20mg。口服，每次20～40mg，1日3次。

木犀草素 Luteolin

本品为白毛夏枯草（Ajugadecumbus）或青兰（Dracocephalumintegrifolium）的有效成分，属弱酸性四羟基黄酮化合物，已能人工半合成。

【性状】为黄色针状结晶，熔点228～230℃（分解）。微溶于水，可溶于碱性溶液中。

【药理及应用】本品具有镇咳和祛疾作用。前者与其抑制咳嗽中枢有关；后者与其促进呼吸道腺体分泌和使痰液中酸性粘多糖溶解有关。此外，本品还有抗炎症作用、抗过敏作用和免疫增强作用。对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌、绿脓杆菌尚有抑菌作用。用于慢性支气管炎和其他呼吸道疾病的痰多咳嗽。

【用法】口服，每次20～40mg，1日3次。

【注意】部分病人可见口干、胃不适、头晕、恶心等反应，可随用药时间延长而逐渐消失。

【制剂】片剂：每片20mg。

枇杷止咳露

【主要成分】枇杷把叶流浸膏、氯化铵等

【应用】止咳、祛痰

【用法】每次5～10ml，1日3次

热参

为茄科植物漏斗泡囊草（Physochlainainfundibularis）的根，亦称华山参、秦参。主要含东莨菪碱、莨菪碱、莨菪苷等有效成分。

【药理及应用】本品具有抗胆碱作用，可松弛支气管平滑肌，缓解支气管平滑肌痉挛。并能抑制气管、支气管粘液腺分泌，使痰量减少。用于哮喘型慢性支气管炎，对咳、痰、喘症状均有一定疗效，尤以平喘作用最为显著。

【用法】见制剂项。

【注意】有口干、嗜睡、视力模糊、瞳孔散大等副作用。青光眼患者禁用。孕妇慎用。

【制剂】热参浸膏片：每片含热参有效成分0.23mg。口服，每次1片，1日2或3次，10日为1疗程。

止咳喘热参片：口服，每次1～2片，1日3次。

热参气雾剂：每ml含热参总生物碱，以莨菪碱计为4.5～5.5mg。每次0.25mg，1日3～4次。

伞花烃 p-Cymene

为杜鹃科植物宽叶杜鹃（LedumpalustreL.vardilatatumwahlanberg）的有效成分。

【性状】无色透明油状物，有特异香味。沸点176～177℃。比重0.835～0.860。不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、丙酮及液状石蜡。

【药理及应用】本品具有显著的祛痰作用和抗炎作用。其祛痰作用可能是由于刺激胃粘膜感受器，反射性地使呼吸道腺体分泌增加以及加速粘液纤毛运动所致。用于慢性支气管炎，可使痰液变稀，痰量增多，易于咯出，咳嗽亦减轻。

【用法】口服，每次4～80mg，1日3次。

【注意】偶见轻微头晕、口干、心窝部不适等副作用。风湿性心脏病、肺心病伴心功能不全者和冠心病患者慎用。

【制剂】胶丸：每粒40mg。

【贮法】防潮、防热，置阴凉干燥处保存。

痰咳净

（散剂）

【主要成分】桔梗、北杏仁、龙脑、甘草、咖啡因

【应用】祛痰、止咳

【用法】含化吞服，每次1小药匙（0．2g）1日3～6

小儿止咳糖浆

【主要成分】每瓶100ml含甘草流浸膏15ml、桔梗流

浸膏3ml、橙皮酊2ml、氯化铵1g

【应用】小儿感冒、支气管炎引起的咳嗽、痰多

【用法】2～5岁，每次5ml5岁以上，每次5～10ml，2岁以下酌减，1日3～4次

哮喘片

【主要成分】麻黄碱、山梗菜碱、颠茄浸膏、氨基比林、茶碱，苯巴比妥

【应用】支气管哮喘、哮喘型支气管炎

【用法】每次1～2片，1日3次

新碧桃仙片

【主要成分】百部、夏枯草、何首乌、马兜铃、淫羊藿、土茯苓、知母、川草薤、甘草酸铵、胆汁

【应用】支气管哮喘、哮喘型支气管炎

【用法】每次4～8片，1日2或3次

止咳糖浆

【主要成分】每瓶100ml内含氯化铵2g、甘草流浸膏35m1、百部流浸膏1ml、桔梗流浸膏3ml、桑白皮流浸膏1．6ml、盐酸麻黄碱0．05g

【应用】咳嗽、多痰、支气管炎等

【用法】每次10ml，1日3次

需要全本请访问 www.ertongbook.com