

作者在总结抗癌中草药的最新研究成果和临床应用经验的基础上编写了本书，按照功效将 300 余味具有抗癌效验的中草药分为六章，详述其药物基源、性味功效、抗癌药理作用以及临床抗癌配伍应用，希望能有助于总结中医药防癌抗癌取得的新成果，启发中医药抗癌的新思路。本书适用于各级中医师、中西医结合的临床医师以及癌症患者和关注健康的普通大众。

图书在版编目 (CIP) 数据

抗癌中草药/周宜强, 范竹雯, 杨建宇主编. —北京: 化学工业出版社, 2007. 11

ISBN 978-7-122-01398-9

I. 抗… II. ①周…②范…③杨… III. 抗癌药 (中药)-研究 IV. R286.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 165483 号

责任编辑: 李少华 蔡 红 装帧设计: 郑小红
责任校对: 宋 夏

出版发行: 化学工业出版社 生物·医药出版分社
(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京云浩印刷有限责任公司
850mm×1168mm 1/32 印张 10 $\frac{1}{4}$ 字数 277 千字
2008 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686)
售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 19.80 元

版权所有 违者必究

前言

由于精神压力、环境改变、不良生活习惯等多种因素的综合作用，目前癌症已成为导致死亡的首位病因，严重威胁人民的健康。中医药在防癌抗癌、减少放化疗副作用、延长生存期、提高生存质量等方面一直被认为具有肯定的效果，在攻克癌症方面被寄予很大希望。

作者在总结抗癌中草药的最新研究成果和临床应用经验的基础上编写了本书，按照功效将300余味具有抗癌效验的中草药分为六章，每味中草药详述其药物基源、性味功效、抗癌药理作用以及临床抗癌配伍应用。希望本书的出版能有助于总结中医药防癌抗癌取得的新成果，启发中医药抗癌的新思路。

本书适用于各级中医师、中西医结合的临床医师以及癌症患者和关注健康的普通大众。

由于时间有限，疏漏之处在所难免，敬请广大读者指正！

编者

2007年10月

编写人员

主 编 周宜强 范竹雯 杨建宇

主 审 周岱翰 邵梦阳

副 主 编 孙永章 李彦知 刘从明

编写人员 (按汉语拼音排序)

范竹雯 高尚社 蒋士卿 李彦知 刘从明

尚志华 史金花 苏 根 苏 玲 孙永章

王黎军 王晓萍 王仰宗 魏素红 魏素丽

杨 杰 杨建宇 杨振江 于海波 张大明

赵建成 郑绍明 周宜强

第一章

温经消积药

本类药的药味多辛香，药性均温热，具有温里祛寒，温经通络，芳香健脾，助阳通滞，行气止痛，顺气降逆，疏肝解郁或消积散结等功效，用于治疗多种癌瘤中属里寒证或气机不畅所致的气滞、气逆者。里寒证患者常见脘腹冷痛、呕吐泻痢或畏寒肢冷、面色苍白、小溲清长、舌淡苔白、脉象沉细；甚或大汗亡阳、四肢厥逆、脉微欲绝等症。气滞患者常表现为患处闷、胀、痛，气逆者常表现为呕恶、呃逆或喘息。如肺失宣降则见胸闷不畅，咳嗽气喘；肝气郁滞则见胁肋疼痛，胸闷不舒，疝气疼痛，乳房胀痛或结块，以及月经不调；脾胃气滞则见脘腹胀满疼痛，嗝气泛酸，恶心呕吐，便秘或腹泻等症。

本类抗癌药均能不同程度地抑杀癌瘤细胞，但主治有异，如用于治消化系统肿瘤的有高良姜、白豆蔻、吴茱萸等，用于治生殖系统肿瘤的有桂枝、石榴皮、木香、花椒等，应区别使用；有不少药物能提高机体免疫功能，增强抗癌能力，如白豆蔻、小茴香等；部分药物能增强放疗、化疗的作用或减轻放疗、化疗的副作用，如苍耳子、白芷、小茴香等。此外，本类药物尚具有抗病原微生物、消炎、助消化、镇吐、镇痛、降血压、降血糖等作用。

寒凝气滞常致血瘀、痰凝、湿阻、食积等，宜配合活血化痰药、宣肺化痰药、健脾化湿药、消食导滞药，以提高疗效。本类药物药性辛热而燥，易于耗气伤阴，凡属热证、阴虚证、气虚证及孕妇忌用或慎用。

艾叶（《名医别录》）

为菊科植物艾的叶片。若连枝割下，晒干捣绒，名艾绒。苦、

辛，温。具有温经止血，散寒止痛功能。艾叶有抗肿瘤活性和抗噬菌体的作用，并能增强网状内皮细胞的吞噬功能。此外，艾叶有止血和抑制细菌、病毒的作用。艾叶油尚有祛痰、止咳、平喘、镇静等作用。

【用法用量】 内服：煎汤，3~10g。外用：适量，捣敷、煎水熏洗或炒热温熨；捣绒做艾炷或制成艾条灸。艾叶油（胶囊装）每次服0.1ml，每日3次。

【抗癌效验】 临床常用治胰腺癌、肺癌、脊髓肿瘤等癌瘤中属寒凝经络或脾肾阳虚者。

1. 胰腺癌 沉香、木香、乳香、羌活、干姜、炮山甲、冰片、没药各5g，麝香0.5g。共研细末，加艾绒150g制成艾条，先针后灸。所取穴位：天突、章门、中腕、涌泉。（《实用抗癌验方》）

2. 肺癌 生艾叶20g，大蒜20瓣，百部、木瓜各12g，陈皮、山豆根、蜂房、全蝎、生姜各10g，瓦楞子30g，生甘草3g。水煎服，每日1剂。（《肿瘤资料选编》）

3. 脊髓肿瘤 艾叶30g，防风、荆芥、白芷、桔矾各9g。水煎去渣取汤洗患处。（《抗癌植物药及其验方》）

【使用注意】 本品气味芳香不宜久煎；性温燥，用量不宜过大，否则可引起胃肠道急性炎症，中枢神经兴奋出现谵妄、惊厥及肝损害等，阴虚血热者慎用。散寒止痛宜生用，温经止血宜炒炭用。

苍耳子（《神农本草经》）

本品为菊科植物苍耳的果实。辛、苦，温。有小毒。具有升阳通窍，祛湿止痛功能。苍耳对EC瘤细胞有抑制活性；苍耳子热水浸出液对腹水型肉瘤S₁₈₀、人子宫颈癌有抑制效果。此外，本品还有抗革兰阳性球菌和真菌、抗排异、镇咳、降压、降血糖等作用。

【用法用量】 煎服：煎汤，3~10g；或入丸散。

【抗癌效验】 临床常用治鼻咽癌、脑肿瘤、神经系统恶性肿瘤、阴茎癌等癌瘤中属寒凝，痰湿积聚者。

1. 鼻咽癌 ①苍耳子 12g，辛夷花 10g（包煎），北沙参 15g，川石斛 12g，玉竹 12g，白花蛇舌草 15g，龙葵 30g，海藻 12g，野菊花 15g，焦山栀 10g，生地、赤芍各 15g，白茅根 30g，藕节 15g，麦冬 30g，象贝母 10g，玄参 12g，桃仁 6g，夏枯草 15g，大枣 7 枚。水煎服，每日 1 剂，分 2 次服。[上海中医药杂志，1989，(1)：27] ②苍耳子、辛夷、白芷、龙胆草、生石决明、钩藤各 9g，夏枯草、蜈蚣、僵蚕各 6g，全蝎 0.9g，牡蛎 30g。水煎服，每日 1 剂。（《福建中草药处方》） ③苍耳子 7.5g，辛夷 15g，白芷 30g，薄荷 1.5g。共为细末，每服 6g。（《抗癌植物药及其验方》）

2. 颅内肿瘤 苍耳子 12g，魔芋（久煎 2h，切勿误食药渣）30g，重楼 12g，远志肉 4g，石菖蒲 6g。水煎服，每日 1 剂，分 3 次服。（《肿瘤的辨证施治》）

3. 神经系统恶性肿瘤 天南星、生半夏（有毒，宜久煎）各 30g，苍耳草、白蒺藜各 15g，加生姜适量，水煎服。每日 1 剂。（《实用抗癌手册》）

4. 阴茎癌 土茯苓 60g，金银花 12g，威灵仙 9g，白鲜皮 9g，甘草 6g，苍耳子 15g。每日 1 剂，煎 2 次分服。另用茶叶加食盐适量煎汁局部冲洗。（江西瑞金县人民医院方）

【使用注意】 本品有一定毒性，过量可中毒而致呕吐、腹痛、腹泻等症，切忌大剂量使用。本品性偏升散，血虚头痛慎用。

桂枝（《神农本草经》）

为樟科植物肉桂的嫩枝。辛、甘，温。具有发汗解表，温经通阳功能。桂皮醛有抗肿瘤活性。体外筛选桂枝对肿瘤细胞有抑制效果。此外，本品还有利尿、抗菌、抗病毒、解热和抗超敏反应等

作用。

【用法用量】 内服：煎汤，3~10g；或入丸、散。

【治癌效验】 临床常用治肝癌、恶性淋巴瘤、卵巢癌、子宫癌、肺癌等癌瘤中属寒凝血瘀或阳虚者。

1. 原发性肝癌 桂枝、柴胡、肉桂、炮姜、附子、白术、茯苓、滑石、急性子、牵牛子、槟榔各 15g，良姜、陈皮、青皮、延胡索各 10g，茵陈、熟地黄各 30g，砂仁 5g，斑蝥 10 个。水煎服，每日 3 次，连服 1 个月。《《妙方秘笈》》

2. 恶性淋巴瘤 桂枝、乌药、桃仁、红花、升麻各 10g，干姜、附子、熟地、牵牛子、槟榔各 30g，小茴香 20g，三棱、莪术、大黄、玄明粉各 15g。水煎服。《《抗肿瘤中药的治癌效验》》（本剂药物含攻下药，且分量较大，宜慎用）

3. 卵巢癌 桂枝、桃仁、大黄各 15g，茯苓 40g，牡丹皮、白芍、阿胶各 20g，甘遂 5g。水煎服，每日 1 剂。《《抗癌良方》》

4. 子宫癌 桂枝、茯苓、三棱、莪术、黄药子、茜草、白头翁、半枝莲各 20g，黄柏、黄芩、牡丹皮、赤芍、红花、桃仁各 15g。水煎服，每日 1 剂。《《抗癌良方》》

5. 肺癌 桂枝、王不留行各 30g，制附片 12g（先煎 4h），黄芪 60g，丹参、莪术、炙甘草各 15g，干姜 6g，大枣 12 枚。水煎服，每日 1 剂。《《抗肿瘤中药的治癌效验》》

【使用注意】 本品辛温助热，易伤阴动血，凡温热病及阴虚阳盛，血热妄行诸证均忌用；孕妇及月经过多者慎用。

石榴皮（《名医别录》）

为石榴科植物石榴的果皮。酸、涩，温。具有温经涩肠，止泻杀虫功能。石榴皮对小鼠肺腺瘤有强抑制活性。此外，还有驱虫、抑菌和抗真菌的作用。

【用法用量】 内服：煎汤，3~10g；或入丸散。外用：适

量，研末调敷或煎水熏洗。

【治癌效验】 临床常用治肠癌、子宫癌等癌瘤中属脾胃虚寒兼泻痢者。

1. 结肠癌 石榴皮、败酱草各 15g，铁苋菜 30g，茯苓、白术、淮山药、罂粟壳各 12g，甘草 3g。水煎服。（《抗癌植物药及其验方》）

2. 肠癌 石榴皮 20g。水煎汤去渣，药液加白糖调味空腹顿服。（《抗癌植物药及其验方》）

3. 子宫癌 将鲜石榴（连皮带子）和仙人掌分别捣碎、交替服用，每天于饭后 40min 和睡前各服 15g。（河北新医大方）

【使用注意】 泻痢初起忌服。

高良姜（《名医别录》）

为姜科植物高良姜的根茎。辛，热。具有健脾温中，止痛止呕功能。高良姜热水提取物对小鼠肉瘤 S₁₈₀ 有明显的抗癌活性；高良姜能抑制黄曲霉素的生长。此外，高良姜还有抗菌等作用。

【用法用量】 内服：煎汤，3~10g。

【治癌效验】 临床常用治肝癌、胃癌等癌瘤中属脾胃虚寒或气血阻滞者。

1. 肝癌 高良姜、丁香、砂仁各 10g，生姜 15g，大蒜 8 枚，食盐 5g。同捣为泥，贴中脘、足三里（双），每日一换。[浙江中医杂志，1984，（10）]

2. 胃癌 高良姜、槟榔等份，各炒为末，米汤调下 6g。（《百一选方》）

豆蔻（《开宝本草》）

为姜科植物白豆蔻的干燥成熟果实。辛，温。具有化湿行气，

温中止呕功能。白豆蔻提取物可增强对肿瘤的免疫功能，破坏癌细胞外周防护因子，使癌组织容易被损害。此外，本品还有增强肠管蠕动、促进胃液分泌、制止肠内异常发酵、止呕等作用。

【用法用量】 内服：煎汤，3~6g，宜后下。

【抗癌效验】 临床常用治食管癌、胃癌、胆囊癌等癌瘤中属脾胃虚寒、痰凝气滞者。

1. 食管癌 ①广木香、白及、乌梅、硼砂各15g，豆蔻（去皮）15g，铅丹12.5g，雄黄5g。共研细末，炼蜜为丸，每日2次，每次服5~10g。饭前白开水送下，或在口中徐徐含化。（《抗癌良方》）②豆蔻25g，硼砂20g，广木香、乌梅各15g。共为细末，炼蜜为丸，分为10份，每日服1份，开水送服。（《抗癌植物药及其验方》）

2. 胃癌 豆蔻（去皮60g），甘草（炙）150g，木香90g，厚朴（去皮生姜汁炙熟）500g，缩砂仁、丁香、青皮（去白）、陈皮（去白）各120g，香附（去毛）1500g。上为细末。每服6g，加生姜20片，盐少许，沸汤点下，不拘时候。（《抗癌中草药大辞典》）

3. 胆囊癌 豆蔻、石菖蒲、连翘、郁金、延胡索各15g，滑石、黄芩、藿香各12g，川贝母、木通各10g，茵陈30g。水煎服。（《抗癌植物药及其验方》）

【使用注意】 本品辛温，阴虚血燥者忌服。

砂仁（《本草原始》）

为姜科植物阳春砂、海南砂或缩砂的干燥成熟果实。辛，温。具有化湿行气，温中安胎功能。本品对癌细胞有抑制活性。此外，砂仁煎剂对豚鼠离体肠管低浓度兴奋，高浓度则为抑制作用。本品尚有抗溃疡、抑制胃酸分泌、增进胃肠运动及抗血小板凝集等作用。

【用法用量】 内服：煎汤，3~6g，宜后下。

【治癌效验】 临床常用治食管癌、胰腺癌、肝癌、白血病、鼻咽癌等癌瘤中属湿阻气滞或痰气交阻者。

1. 食管癌 砂仁 6g, 旋覆花 9g, 代赭石 30g, 莱菔子 9g, 郁金 9g, 瓜蒌 30g, 贝母 9g, 沙参 15g, 石斛 15g, 麦冬 9g, 玄参 9g。水煎服。(《抗癌中草药大辞典》)

2. 胰腺癌 生三棱、生莪术、瓦楞子各 18g, 香附、木香、砂仁、苏木、红花、陈皮、半夏、枳实、木通各 15g, 大黄 9g, 厚朴 15g, 延胡索 15g, 水蛭 18g。制成片剂(每片约 0.3g), 每次服 3g, 口服 3 次。(沈阳医学院附属医院方)

3. 肝癌 生莪术、生三棱、生水蛭、瓦楞子各 18g, 苏木、红花、延胡索、香附、木香、陈皮、半夏、厚朴、枳实、木通各 15g, 砂仁 5g, 大黄 9g。研成散剂, 口服, 每次 3g, 每日 3 次。(沈阳医学院附院方)

4. 慢性粒细胞性白血病 砂仁 9g, 癞蛤蟆 1 个。将砂仁填入蛤蟆腹内, 用黄泥包好, 放火上烤酥, 研细面, 每日 3 次, 每次 3g, 开水送服。(《抗癌中草药大辞典》)

5. 鼻咽癌 党参 12g, 白术 9g, 茯苓 12g, 山药 12g, 制南星 12g, 制半夏 12g, 陈皮 9g, 薏苡仁 30g, 苍术 9g, 川厚朴 9g, 白扁豆 12g, 砂仁 3g (后入), 猪苓 15g。每日 1 剂, 水煎服。(上海中医学院附属医院方)

吴茱萸 (《神农本草经》)

为芸香科植物吴茱萸、石虎或疏毛吴茱萸的将近成熟果实。辛、苦, 热。有小毒。具有温经散寒, 疏肝止痛功能。本品对肿瘤有抑制作用, 所含的右旋吴茱萸碱对人鼻咽癌 (KB) 和小鼠淋巴细胞白血病细胞 P₃₈₈ 有极强的细胞毒活性; 乙醇提取物对中国仓鼠肺癌细胞 (V₇₉) 也有细胞毒活性。此外, 本品尚有抑菌、镇吐、降压、镇痛和收缩子宫等作用。

【用法用量】 内服：煎汤，1.5~5g。外用：适量。

【抗癌效验】 临床常用治大肠癌、胰腺癌、脑肿瘤等癌瘤中属脾肾阳虚、寒湿凝滞、肝气郁滞者。

1. 大肠癌 吴茱萸、党参、茯苓、白术、肉豆蔻、补骨脂、赤芍、诃子肉、苍术、焦山楂、槟榔各10g，五味子、老鹳草各15g，黄芪、薏苡仁各30g。水煎服，每日1剂。[山东中医杂志，1998，(4)]

2. 胰腺癌 吴茱萸2g，黄连、生甘草各3g，乌梅5g，赤芍、白芍各12g，白花蛇舌草、石打穿各20g，炒延胡索、川楝子、莪术、炙僵蚕各10g。水煎服，每日1剂。[新中医，1998，(10)]

3. 脑肿瘤 吴茱萸100g，研极细末，用镇江米醋调成糊状贴敷于两足心，用麝香风湿膏固定。用前应用热水洗净双足。2天一换。《《抗癌植物药及其验方》》

【使用注意】 本品辛热燥烈，易损气动火，不宜多用久服，阴虚有热者忌用。

干姜 《神农本草经》

为姜科植物姜的干燥根茎。辛，热。具有温中散寒，回阳健胃功能。干姜中的多种萜烯、姜醇、龙脑等对瘤癌细胞生长有一定抑制活性。此外，本品还能兴奋中枢和心脏，健胃、止呕等。

【用法用量】 内服：煎汤，3~10g；或入丸散。

【抗癌效验】 临床常用治消化系统肿瘤、胰尾癌等癌瘤中属脾胃虚寒、寒痰凝滞者。

1. 消化系统肿瘤 人参6g，干姜5g，炙甘草6g，白术9g。水煎去渣，温服，每日分3次服。服后，可饮适量热粥以助药力。《《抗癌良方》》

2. 胰尾癌 川椒10g，干姜10g，党参15g，白术10g，白芍

15g, 茯苓 10g, 猪苓 10g, 百合 30g, 藿香 10g, 佩兰 10g, 白花蛇舌草 30g。水煎服。《《抗癌中草药大辞典》》

【使用注意】 本品辛热燥烈, 阴虚有热、血热妄行者忌服; 孕妇慎服。

沉香 (《名医别录》)

为瑞香科常绿乔木植物沉香及白木香含有黑色树脂的木材。辛、苦, 温。具有行气止痛, 降逆调中, 温肾纳气功能。沉香的热水提取物对子宫颈癌细胞有抑制活性; 沉香树茎皮中的细胞毒成分对淋巴细胞性白血病有显著抑制效果, 并有升高白细胞的作用。此外, 本品还具有镇吐、止咳、平喘、抗细菌和霉菌的作用。

【用法用量】 内服: 1~1.5g, 研末冲服, 亦可用原药磨汁服。

【抗癌效验】 临床常用治食管癌、胃癌、贲门癌、肠癌、肝癌等肿瘤中属寒凝气滞、脾胃虚寒或下元虚冷、气逆于上者。

1. 食管癌 ①沉香、硼砂各 1g, 姜半夏 12g, 广陈皮 6g, 茯苓、山豆根各 9g, 射干 6g; 乌梅 3 个, 生甘草 4.5g, 桃仁泥 9g。水煎 2 次, 每日 1 剂。《《安徽单验方选集》》 ②沉香 10g, 礞石 15g, 冰片 10g, 硼砂 60g, 火硝 30g, 砌砂 6g。共研为细末, 每次 3g, 噙化缓下, 至黏沫吐尽, 连服两天即停药。《《肿瘤临床》》 ③沉香 4.5g, 硼砂 4.5g, 青黛 3g, 共研细末。取白萝卜 500g, 生姜 250g, 捣碎压汁, 荸荠汁 500g, 调匀。每日 3 次, 每次 3 匙, 加上药末 0.2g 冲服。《《癌症秘方验方偏方大全》》

2. 胃癌 ①沉香、紫苏子、豆蔻各 3g。共研为末, 每服 1.5~2.1g, 柿蒂汤送下。《《抗癌植物药及其验方》》 ②沉香 4g, 党参 30g, 白术 15g, 茯苓 12g, 陈皮、天南星各 10g, 白花蛇舌草、半枝莲各 30g, 炒大黄 (研粉吞) 10g, 豆蔻 (后下) 6g。水煎服, 每日 1 剂。[新疆中医药, 1989, (4): 54]

3. 贲门癌 ①沉香 50g, 硼砂 80g, 山慈菇 200g, 礞砂、三七

各 20g, 冰片 30g。诸药共研极细末, 每日 4 次, 每次 10g, 10 天为一疗程。服完一疗程后改为每日 2 次, 每次 10g, 以巩固疗效。[浙江中医杂志, 1989, (6): 246] ②沉香曲 12g, 姜半夏、姜竹茹各 9g, 黄连 3g, 煨瓦楞子 30g, 生鸡内金 6g, 公丁香、广木香、川楝子各 9g, 延胡索、失笑散各 12g, 砂仁、豆蔻仁各 3g, 大小蓟、太子参、生大黄(后下)各 12g。水煎服, 每日 1 剂。《千家妙方》)

4. 肠癌 沉香曲 9g, 木馒头 30g, 石见穿 12g, 广木香 6g, 天龙 2 条, 山慈菇 12g, 黄柏、浙贝母各 9g, 生熟薏苡仁各 24g, 制大黄 9g, 夏枯草 24g。水煎服, 每日 1 剂。《肿瘤的辨证施治》)

5. 肝癌 沉香 15g, 木香 12g, 槟榔 24g, 土鳖虫 15g, 草豆蔻、砂仁各 24g, 壁虎 15g。先将壁虎浸泡于已烧熟的米酒内, 一昼夜后, 取出焙干, 如此再浸再焙 3 次, 与其余各药共研细末。每服 3~6g, 每日 3 次, 开水冲服。《湖南中草药单方验方选编》)

【使用注意】 本品辛温助热, 阴虚火旺或气虚下陷者慎用。

木香 《神农本草经》

为菊科植物云木香、川木香的根。辛、苦, 温。具有行气散结, 调中止痛功能。广木香内酯对人体鼻咽癌细胞有细胞毒作用; 木香所含桉木醇对大鼠 W_{256} 有抗肿瘤活性。此外, 本品尚有对抗组胺与乙酰胆碱的解痉作用。此外, 还有降压、扩张血管、利尿及抗菌作用。

【用法用量】 内服: 煎汤, 3~10g; 或入丸、散。生用专行气滞, 煨熟用以止泻。外用: 适量, 研末调敷或磨汁涂。

【抗癌效验】 临床常用治食管癌、肝癌、胰腺癌、恶性淋巴瘤等癌瘤中属肝胃气滞、脾胃虚寒者。

1. 食管癌 ①广木香 10g, 公丁香 10g, 沉香曲 12g (或降香 10g, 藿香 12g), 石斛 12g, 川楝子 12g, 川厚朴 10g, 南、北沙参

各 12g, 天冬 12g, 姜半夏 12g, 姜竹茹 12g, 旋覆花 12g (包煎), 代赭石 30g, 仙鹤草 30g, 当归 6g, 急性子 21g, 全蜈蚣 21g。水煎服, 每日 1 剂。《《肿瘤的防治》》 ②广木香、白及、乌梅、硼砂各 15g, 豆蔻 (去皮) 15g, 铅丹 12.5g, 雄黄 5g。共研细末, 炼蜜为丸, 每次服 5~10g, 一日 2 次, 饭前白开水送下, 或在口中徐徐含化。《《抗癌良方》》

2. 肝癌 ①木香、甘松各 30g, 炙甘草 180g, 香附 500g, 煨莪术 240g。上为细末, 水糊为丸, 如梧桐子大。每服 20 丸, 生姜、陈皮煎汤送下, 不拘时候。《《局方》》 ②木香、戎盐 (炒)、京三棱各 15g, 厚朴 30g, 枳实、炙甘草各 9g, 干姜、莪术各 6g。上药为末, 每服 9g, 空腹时用淡生姜汤调下。《《卫生宝鉴》》

3. 胰腺癌 木香、延胡索、紫草根、白芍、牡丹皮、鸡内金各 9g, 蒲公英、薏苡仁、金银花各 15g。水煎送服参三七 3g, 人工牛黄 0.03g。《《抗癌植物药及其验方》》

4. 恶性淋巴瘤 木香、延胡索、郁金、枳壳、丹参、红花、五灵脂、鸡内金、柴胡、白术、白芍、茯苓各 9g, 鳖甲、牡蛎各 15g, 砂仁壳、甘草各 6g。水煎服。《《抗癌植物药及其验方》》

白芷 《《神农本草经》》

为伞形科植物兴安白芷或川白芷和杭白芷的根。辛, 温。具有解表, 祛风燥湿, 消肿止痛功能。白芷所含的异欧前胡素对 Hela 细胞有细胞毒作用。此外, 本品尚有抑菌、抗真菌、扩张冠状血管、抗过敏、促进分泌型 IgA 产生等作用。

【用法用量】 内服: 煎汤, 3~10g; 或入丸散。外用: 适量, 研末撒或调敷。

【抗癌效验】 临床常用治颅内肿瘤、鼻咽癌、乳腺癌、骨癌等癌瘤中属寒湿凝滞或风寒郁滞者。

1. 颅内肿瘤 夏枯草 30g, 昆布 15g, 海藻 30g, 桃仁 9g, 白

芷 9g, 石见穿 30g, 王不留行子 12g, 赤芍 15g, 露蜂房 12g, 野菊花 30g, 生牡蛎 30g, 全蝎 6g, 蜈蚣 9 条, 天龙 2 条。水煎服。(上海市中医院方)

2. 鼻咽癌 白芷、连翘、荆芥、银花、黄芩、桑白皮、玄参、地丁各 15g, 防风、薄荷、栀子各 10g, 射干、生地各 20g, 甘草 7g。水煎服, 并滴鼻内, 每天 3~5 次。《抗癌植物药及其验方》

3. 乳腺癌 ①蒲公英 10g, 瓜蒌 60g, 甲珠 6g, 地丁 10g, 夏枯草 15g, 银花 15g, 当归 30g, 黄芪 15g, 天花粉 6g, 白芷 15g, 桔梗 15g, 赤芍 6g, 薤白 15g, 远志 10g, 肉桂 10g, 甘草 6g, 每日 1 剂, 煎 2 次分服, 饭前 2h 空腹时服。(辽宁抚顺新宾人民医院方) ②当归 45g, 夏枯草 45g, 橘核 12g, 白芷 6g, 僵蚕 6g, 丹参 15g, 爵床草 30g。口服, 每日 1 剂, 煎 2 次分服, 或用水酒炖服, 连服 20~30 剂为 1 疗程。(福建省第一人民医院方)

4. 骨癌 夏枯草 60g, 藁本、川芎、乳香、当归、没药、红花、三七各 30g, 白芷、薄荷、桃仁各 15g。水煎服, 每日 1 剂。《抗癌良方》

花椒 《神农本草经》

为芸香科植物花椒或青椒的干燥成熟果皮。亦称川椒。辛, 热。有小毒。具有温中止痛, 散结杀虫功能。花椒对小鼠肉瘤 S₁₈₀ 有抑制活性。此外, 本品尚有抑菌、抗真菌、杀虫、局部麻醉等作用。

【用法用量】 内服: 煎汤, 2~5g; 或入丸、散。外用: 适量, 研末或煎水浸洗。

【治癌效验】 临床常用治胃癌、子宫颈癌、阴道癌、脑垂体瘤、皮肤癌、乳腺癌等癌瘤中属脾胃寒凝、湿浊阻滞者。

1. 胃癌 鲜花椒 30g, 橘皮 10g, 生姜 6g, 瘦猪肉 40g。熬熟食用, 常服。《癌症秘方验方偏方大全》

2. 子宫颈癌 花椒 9g, 人参 18g, 生鳖甲 18g。共为细末, 分

为6包，每晚服1包，开水送下，连服3包后腹痛可减轻，连用24包为1疗程。（《抗癌本草》）

3. 阴道癌 川椒、茄根、马兰花、车前草各15g，生枳壳、大戟各30g，大黄、五倍子、苦参、皮硝、瓦松各9g。水煎后，熏洗阴道，每日1次。（《抗癌植物药及其验方》）

4. 脑垂体瘤 玳瑁粉10g（冲服），炒花椒10g，鹿茸草30g，天葵子20g，川红花10g，桃仁15g，川芎10g，薏苡仁30g，僵蚕15g。另用铁扫帚60g，煎水熬药。（《抗癌中草药大辞典》）

5. 皮肤癌 蛇床子30g，龙葵子30g，五倍子15g，败酱草30g，苦参20g，蒲公英30g，花椒15g，白鲜皮30g。煎汤浸洗患处，每日1~2次。本方对皮肤癌溃疡型、菜花样肿瘤效果较好。（《抗癌中草药大辞典》）

6. 乳腺癌 茯苓、薏苡仁、防己、葶苈子、猫爪草、白花蛇舌草各30g，仙灵脾15g，党参、白术各12g，桂枝9g，川椒6g，甘草6g，大枣10个。每日1剂，煎2次分服。（上海中医药大学龙华医院方）

【使用注意】 阴虚火旺者忌服。孕妇慎服。

胡椒（《新修本草》）

为胡椒科植物胡椒的干燥果实。辛，热。具有温中止痛，暖胃祛积功能。胡椒水煎液对小鼠腹水癌S₁₈₀肉瘤有抑制作用。此外，本品尚有抗炎、镇静以及抗惊厥、止痛等作用。

【用法用量】 内服：煎汤，2~4g；研粉吞服每次0.5~1g。外用：适量。

【治癌效验】 临床常用治胃癌等癌瘤中属脾胃虚寒或寒痰积聚者。

胃癌 ①冰片1.5g，胡椒（黑白均有）7g。研末，装入胶囊开水送服，每日4次。[山东中医杂志，1997，(2)] ②参三七

10g, 血竭、砂仁、冰片各 2g, 僵蚕 5g, 胡椒 1.5g。又方制马钱子、胡椒、粳米各 1.5g, 蜈蚣 5 条, 水蛭 3g, 冰片 0.9g, 砂仁 2g。两方分别研为细末, 各分为 7 包, 每次 1 包, 一日 3 次。先服前方, 30min 后再服后方, 食后白开水冲服。[浙江中医杂志, 1988, (8): 368]

乌药 (《本草拾遗》)

为樟科植物乌药(天台乌药)的根。亦称台乌药。辛, 温。具有行气止痛, 温肾散寒功能。乌药对小鼠肉瘤 S₁₈₀ 有抑制作用。此外, 本品还有升压、发汗、促进血液循环、兴奋心脏、健胃以及止血、抗菌等作用。

【用法用量】 内服: 煎汤, 5~10g; 磨汁或入丸、散。

【抗癌效验】 临床常用治食管癌、胃癌、乳腺癌等癌瘤中属肝气郁结、寒郁气滞、气滞血瘀者。

1. 食管癌 乌药、法半夏各 10g, 炒苏子、青皮、生姜、焦槟榔、三棱、莪术各 15g, 生牡蛎、当归各 25g, 吴茱萸、甘草各 7.5g, 干蟾蜍 2 个。每日 1 剂, 水煎服。另用全蝎 20~50g 加黄酒 500ml 浸 15 天后饮用, 每日 50ml。(天津市中医院方)

2. 胃癌 乌药、陈皮、半夏、三棱、莪术、桃仁、红花、木香、高良姜、佛手、木鳖子各 9g, 枳壳 6g, 炒莱菔子、槟榔、香附子各 15g, 乌贼骨 30g。水煎服。《《抗癌植物药及其验方》》

3. 乳腺癌 乌药 15g, 藤梨根 30g, 红木香 25g。共研为末, 每次服 15g, 每日 3 次。《《抗癌植物药及其验方》》

丁香 (《药性论》)

为桃金娘科植物丁香的花蕾, 又称公丁香。辛, 温。具有温中