中华医学全集

抗变态、寄生虫药物

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目录

抗阿米巴病药.....**2**

◎**比拉米可** BIALAMICOL〔1〕.....2

◎**（安特酰胺，二氯散，**ENTAMIDE）.....2

◎**（安痢平，**ENTOBEX）.....3

◎　　**（对脲基苯胂酸，**FENARSONE）.....3

◎**（药特灵，安痢生，**YATREN）.....5

◎**（消虫痢，维沃仿，**VIOFORM）.....7

抗滴虫病药.....**9**

◎　　**（甲硝基羟乙唑，灭滴灵，灭滴唑，**FLAGYL）

9

◎（戊烷咪）.....14

◎（葡酸锑钠，斯锑黑克，SOLUSTI BOSAN） 【性状】本品为白色或微显淡黄色的无定形粉末；无臭；水溶液显右旋性。在热水中易溶，在水中溶解，在乙醇或乙醚中不溶。.....15

◎（氨酚喹）.....17

◎咯萘啶 MALARIDINE.....23

◎ （磷酸哌喹，抗矽–14，13228R. P.）.....30

◎（黄蒿素，ARTEANNUIN）.....33

◎（优奎宁，碳酸乙酯奎宁，QUI NI NE AETH–YLCARBONATE）.....37

◎ （伯喹，伯氨喹啉）.....39

◎ （息疟定，DARAPRI M）.....41

◎（硫双二氯酚，别丁，BITIN）.....45

◎（海群生，益群生，HETRAZAN，BANOCIDE）...47

◎（环吡异喹酮，EMBAY-8440）.....50

◎（F-30066）.....52

◎（吐酒石）.....53

◎（血防-846，HEXACHLOROPARAXYLOL，HPX，HELOL，846）

.....55

◎（次没锑钠，锑-273，SB-273）.....58

◎（7505、硝二苯胺异硫氰）.....61

◎（硝硫苯酯）.....63

◎（酚嘧啶，间酚嘧啶）.....64

◎ （丙硫达唑，丙硫咪唑，抗蠕敏，扑尔虫，

肠虫清，ZENTEL，ABENTEL，SKF62979，VALBAZEN）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

65

◎（丙氧咪唑）.....68

◎（甲苯达唑，二苯酮咪胺酯，安乐士，VERMOX，ANTIOX，MEBENDACIN，NOVERME，TELMIN，VERMIRAX）.....69

◎（哌哔嗪，驱蛔灵）.....72

◎（抗虫灵，ANTIMINTH）.....75

◎（左咪唑，LEVASDE）.....77

◎ （灭绦灵，育末生，YOMESAN）.....83

◎（甲噻嘧啶）.....85

◎ （扑蛲灵，PYRVINIUM PAMDATE，POVAN）.....86

◎ （噻苯达唑，噻苯咪唑，THIABENDAZOLE，MINTEZOL）.....88

过敏反应介质释剂.....91

◎**丁夫罗林** BUFROLIN〔I〕.....91

◎**曲尼司特** TRANILAST〔I〕.....91

◎**噻拉米特** TIARAMIDE〔I〕.....93

◎**色甘酸钠** SODIUMCROMOGLICATE.....94

◎**色羟丙钠** SODIUM HYDROXYPROPYLCROMATE.....97

◎**四唑硫蒽酮** DOXANTRAZOL.....98

◎**四唑色酮** AA-344.....98

酮替芬 KETOTIFEN.....99

◎**扎普司特** ZAPRINAST〔I〕.....100

◎**阿伐斯汀** ACRIVASTINE〔I〕.....102

◎**阿列马嗪** ALIMEMAZINE〔I〕.....103

◎**阿司咪唑** ASTEMIZOLE〔I〕.....104

◎阿扎他定 AZATADINE〔I〕 105

◎安他唑啉 ANTAZOLIN.....106

◎奥沙米特 OXATOMIDE〔I〕 107

◎奥索马嗪 OXOMEMAZINE〔I〕 108

◎巴米品 BAMIPINE〔I〕 108

◎苯海拉明 DIPHENHYDRAMINE.....109

◎苯噻啶 PIZOTIFEN.....110

◎苯茚胺 PHENINDAMINE〔I〕 112

◎比沙明 CARBINOXAMINE〔I〕 113

◎丙酰马嗪 PROPIOMAZINE〔I〕 114

◎布可利嗪 BUCLIZINE〔I〕 115

◎茶异丙嗪 PROMETHAZINE TEOCLATE.....115

◎氮(艹卓)斯汀 AZELASTINE〔I〕 116

◎地普托品 Deptropinet〔I〕 117

◎多西拉敏 Doxylamine〔I〕 117

◎恩布拉敏 Embramine〔I〕 118

◎二苯拉林 Diphenylpyraline〔I〕 118

二甲替嗪 Dimetotiazine〔I〕 119

◎二甲茚定 Dimetindene〔I〕 120

◎非尼拉敏 Pheniramine〔I〕 120

◎高氯环嗪 Homochlorcyclizine〔I〕 121

◎甲地嗪 Methdilazine〔I〕 122

◎克立咪唑 Clemizole〔I〕 122

◎氯苯那敏 Chlorphenamine 123

◎氯吡拉敏 Chloropyramine〔I〕 124

◎氯环利嗪 Chlorcyclizine〔I〕 124

◎氯雷他定〔基〕 LORATADINE〔I〕 125

◎氯马斯汀 CLEMASTINE.....127

◎美吡拉敏 MEPYRAMINE〔I〕 128

◎美海屈林 MEBHYDROLIN〔I〕 128

◎美可洛嗪 MECLOZINE.....129

◎美喹他嗪 MEQUITAZINE〔I〕 130

◎尼普拉嗪 NIAPRAZINE〔I〕 131

◎哌海茶碱 PIPRINHYDRINATE〔I〕 131

◎羟嗪 HYDROXYZINE.....132

◎曲吡那敏 TRIPELENNAMINE〔I〕 132

◎曲美苄胺 TRIMETHOBENZAMIDE〔I〕 133

◎曲普利定 TRIPROLIDINE.....134

◎去氯羟嗪 DECLOXIZINE.....134

◎赛庚啶 CYPROHENTADINE 135

◎赛克利嗪 CYCLIZINE〔I〕 137

◎司奎那定 SEQUIFENADINE〔I〕 137

◎司他斯汀 SETASTINE〔I〕 138

◎宋齐拉敏 THONZYLAMINE〔I〕 138

◎特非那定 TERFENADINE〔I〕 139

◎托普帕敏 TOLPROPAMINE〔I〕 140

◎西替利嗪 CETIRIZINE〔I〕 141

◎希司咯定 HISTAPYRRODINE〔I〕 142

◎溴苯海拉明 BROMODIPHENHYDRAMINE〔I〕 142

◎溴苯那敏 BROMPHENIRAMINE〔I〕 143

◎依巴斯汀 EBASTINE〔I〕 143

◎异丙嗪〔典〕〔基〕 PROMETHAZINE.....145

需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎异西喷地 ISOTHIPENDYL〔I〕.....147

◎右氯苯那敏 DEXCHLORPHENIRAMINE〔I〕.....148

◎右溴苯那敏 DEXBROMPHENIRAMINE〔I〕.....148

◎粉尘螨注射液.....149

抗寄生虫病药

抗阿米巴病药

◎比拉米可 Bialamicol〔1〕

（卡马风，CAMO－FORM）

【制剂】 片剂：0. 25g

【作用及用途】 为抗阿米巴药，用于急、慢性阿米巴痢与肠外阿米巴病，可与依米丁合用

【用法】 口服：1日3次，1次10. 25～0. 5g，1疗程5天

◎（安特酰胺，二氯散，ENTAMIDE）

【制剂】 片剂：0. 25g；0. 5g

【作用及用途】 能直接杀死阿米巴原虫，对肠内外阿米巴均有效，可与依米丁或氯隆合用

【用法】　口服：1日3次，1次0.5g，10日为1疗程

◎（安痢平，ENTOBEX）

【制剂】　片剂：50mg

【作用及用途】　对溶组织阿米巴滋养体、肠梨形虫、滴虫及革兰氏阴性杆菌等都有抑制作用。可用于急、慢性阿米巴痢

【用法】　口服：成人1日3次，一次0.1g，连服10日

◎（对脲基苯胂酸，FENARSONE）

是一种人工合成的五价胂剂，含砷28.85%。

【性状】白色粉末，有微酸味，几无臭，在空气中稳定，微溶于水，乙醇，几不溶于醚、氯仿，在碱

性溶液内易溶。熔点174℃。

【药理及应用】本品能抑制虫体巯基酶系的活性，杀灭阿米巴滋养体。其效力不及依米丁；与喹碘方大致相近或略差。对于肠外阿米巴病无效。又可用于阴道滴虫病及丝虫病（对丝虫成虫有效，但对微丝蚴无效。对肝有损害，故不宜用于大规模防治）。

【用法】

（1）治阿米巴痢　每日3次，每次服0.1～0.2g，连用10天。小儿每日8mg／kg，分2～3次，连用10日。如粪便检查仍有原虫，可在停药10天以后，再如法服10天。又可用其1%溶液（内加碳酸氢钠2%）作保留性灌肠每次200ml，隔夜1次，可行5次。在灌肠期间，口服须停止。

（2）治阴道滴虫病　每次0.2～0.4g，每晚或隔晚置于阴道内，7日为1疗程。

（3）治丝虫病　每日服0.25～0.5g，分2次服，

连用10日，常与乙胺嗪或左旋咪唑合用。

【注意】

（1）偶有皮疹、恶心、呕吐、腹泻，出现症状应即停药。

（2）严重反应是体重减轻及多尿，偶可发生剥脱性皮炎、粒细胞缺乏症及肝炎、胃炎等。出现症状时，应立即停药。必要时可用二巯基丙醇治疗。

（3）肝肾功能减退及对肿剂敏感的患者禁用。

（4）肿剂能引起继发于肿性皮炎的角膜炎、中毒性视力减弱、一过性近视、视网膜和玻璃体出血。

【制剂】片剂：每片0.1g；0.2g。

◎（药特灵，安痢生，YATREN）

本品为碘羟基喹啉磺酸约4份与碳酸氢钠约1份的混合物。

需要全本请访问www.ertongbook.com