

# 如何炮制中草药（三）

闫新 编著



# 目 录

果实、种子类(续).....	1
诃子 .....	1
核桃仁 .....	2
鹤虱 .....	3
黑豆衣 .....	3
红豆蔻 .....	4
葫芦 .....	4
花椒 .....	4
化橘红 .....	5
槐角 .....	5
火麻仁 .....	6
急性子 .....	6
蒺藜 .....	7
芥子 .....	8
金樱子 .....	8
锦灯笼 .....	9
韭菜 .....	9
橘核 .....	10
橘络 .....	10
决明子 .....	11
苦杏仁 .....	11
莱菔子 .....	15
菘蓂子 .....	16
荔枝核 .....	17
连翘 .....	17
莲房 .....	18

莲子	19
莲子心	19
龙眼肉	20
路路通	20
马兜铃	21
马蔺子	21
马钱子	22
麦芽	26
蔓荆子	28
母丁香	28
木鳖	29
木瓜	29
木蝴蝶	30
牛蒡子	31
女贞子	31
胖大海	32
婆罗子	32
千金子	32
牵牛子	33
芡实	34
青果	35
青皮	35
青葙子	36
肉豆蔻	36
蕤仁	38
桑椹	39
沙苑子	39
砂仁	40

山楂	41
山茱萸	42
蛇床子	43
石莲子	43
石榴皮	44
使君子	44
柿蒂	45
水红花子	45
丝瓜络	46
酸枣仁	46
桃仁	49
甜瓜子	49
葶苈子	50
菟丝子	50
王不留行	51
乌梅	52
吴茱萸	53
五味子	54
相思子	56
香橼	56
小茴香	57
鸦胆子	57
亚麻子	58
芫荽子	58
益智仁	58
薏苡仁	60
罌粟壳	61
郁李仁	61

预知子 .....	62
芸台子 .....	63
栀子 .....	63
枳俱子 .....	65
枳壳 .....	65
枳实 .....	66
猪牙皂 .....	67
紫苏子 .....	68
叶类 .....	68
艾叶 .....	68
参叶 .....	69
侧柏叶 .....	70
大青叶 .....	71
番泻叶 .....	71
功劳叶 .....	71
荷叶 .....	72
橘叶 .....	72
苦竹叶 .....	73
枇杷叶 .....	73
桑叶 .....	74
石楠叶 .....	75
石韦 .....	75
淫羊藿 .....	76
棕榈 .....	77
动物类 .....	78
阿胶 .....	78
斑蝥 .....	79
豹骨 .....	81

鳖甲	82
蚕茧	85
蝉蜕	86
蟾酥	86
穿山甲	87
刺猬皮	88
玳瑁	89
地龙	90
蜂房	91
凤凰衣	92
干蟾	92
蛤蚧	93
蛤壳	94
广角	95
龟板	95
哈士蟆油	98
海狗肾	98
海龙	99
海马	100
海螵蛸	101
红娘子	102
虎骨	103
鸡内金	104
建曲	105
僵蚕	106
九香虫	107
蝼蛄	108
鹿角	108

鹿角霜	109
鹿茸	110
没食子	110
虻虫	111
牡蛎	111
牛黄	112
螃蟹壳	112
疥蟪	113
蕲蛇	113
青娘子	114
全蝎	114
人指甲	115
桑螵蛸	116
山羊血	117
珊瑚	117
蛇蜕	117
麝香	118
石决明	119
水牛角	120
水蛭	120
土鳖虫	121
瓦楞子	122
乌梢索	123
蜈蚣	124
五倍子	124
五灵脂	125
犀角	126
蟋蟀	126

象皮	127
象牙	128
熊胆	128
血余炭	129
夜明砂	130
鱼鳔	130
珍珠	131
珍珠母	132
紫贝齿	133
紫草茸	133
紫河车	133
紫梢花	134
加工类	135
六神曲	135
西瓜霜	136
全草类	136
败酱草	136
半边莲	137
半支莲	137
边钱草	137
扁蓄	138
薄荷	138
车前草	139
大蓟	139
淡竹叶	140
灯心草	140
地丁	141
鹅不食草	142

凤尾草	142
浮萍	142
广藿香	143
旱连草	143
金佛草	144
金牛草	144
金钱草	144
荆芥	145
瞿麦	146
卷柏	146
辣蓼	147
老鹤草	147
刘寄奴	147
鹿衔草	148
麻黄	148
马鞭草	149
马齿苋	150
木贼	150
佩兰	150
蒲公英	151
青蒿	151
肉苁蓉	152
伸筋草	153
石斛	153
鼠曲草	154
菘蓂	154
锁阳	155
透骨草	155

瓦松 .....	156
稀荳蔻 .....	156
细辛 .....	157
仙鹤草 .....	157
香薷 .....	158
小蓟 .....	158
寻骨风 .....	158
益母草 .....	159
阴行草 .....	160
茵陈 .....	160
鱼腥草 .....	160
泽兰 .....	161
紫苏 .....	161
紫苏梗 .....	161

## 果实、种子类(续)

### 诃子

#### 【来源】

本品为使君子科植物诃子 *Terminalia chebula* Retz. 或绒毛诃子 *Terminalia chebula* Retz.var. *tomentella* Kurt. 的干燥成熟果实。

#### 【炮制方法】

一、净制 除去杂质，洗净。取净诃子，稍浸，焖润，去核，干燥，成品称“诃子肉”。

二、切制 用时打碎。

三、炮炙

1.炒制 取净诃子肉，置锅内，用文火加热，炒至深黄色，取出放凉。

2.制炭 取原个诃子，置锅中，用武火炒至焦黑色，喷水灭火星，取出，去核即得。

3.烫制 先将沙子置锅内炒松，倒入净诃子，用中火炒至表面呈焦黄色，鼓起为度，取出，筛去沙子，放凉，剥去核。

4.土制 先将灶心全置锅内炒松，倒入净诃子，用武火炒焦黄色，鼓起为度，取出，筛去土，放凉，剥去核。每诃子 500kg，用灶心土 250kg。

5.蒸制 取净诃子，加水润透，置笼或罐内，蒸至发黑为度，取出，放凉。剥去核，晒干。

6.煨制 用面裹煨法，煨至面皮焦黄为度，剥去面皮，临用时打碎。

7.麸制 取麸皮，撒在锅内，加热至冒烟时，加入净诃子肉，用武火炒至黄褐色时，取出，筛去麸皮，放凉。

#### 【现代研究】

实验结果表明，各炮制品之间鞣质含量并无明显差异，麸炒者略高，诃子核也含近40%的鞣质。各炮制品的成分均未有变化。各炮制品对家兔离体肠管的自发活动和乙酸胆碱及氯化钡引起的肠肌收缩，均有明显的抑制和拮抗作用。带核诃子和诃子核加大剂量可得同样结果，而纯鞣质无此作用。各炮制品都有很好的止泻作用，且无明显差异。带核诃子的止泻作用也很好，但对小鼠小肠输送机能的抑制，则以麸煨者略强。

## 核桃仁

#### 【来源】

本品为核桃科植物胡桃 *Juglans regia* L.的干燥成熟种

#### 【炮制方法】

一、净制 去净外壳及木隔心，取净仁即得。

二、炮制

1.炒制 取核桃仁，微炒后，放冷酥脆即可。

2.煨制 用时连壳烧成黑色，击碎后去壳取仁。

3.盐制 取核桃仁，加盐水拌匀，炒干，每核桃仁100kg，用盐1kg。

4.蜜制 将蜂蜜用文火炼老，取核桃仁倒入，炒拌均匀，待成黄色时，出锅，摊开，晾凉。每核桃仁100kg，

用蜂蜜 20kg。

## 鹤虱

### 【来源】

本品为菊科植物天名精 *Carpesium abrotanoides* L. 的干燥成熟果实。

### 【炮制方法】

- 一、净制 拣去杂质，筛去泥屑即得。
- 二、炮炙 炒制 取鹤虱，用文火炒至有香气，带黄色为度，筛去灰屑。

## 黑豆衣

### 【来源】

本品为豆科植物黑大豆 *Glycine max* Linne) merrill 的黑色干燥种皮。

### 【炮制方法】

- 一、净制 取原药材，除去杂质，筛去灰屑。
- 二、炮炙
  - 1.炒制 除去杂质，用文火微炒。
  - 2.蒸制 将原药除去杂质、种仁及灰屑，淘净（清洁者可不淘），置蒸笼内蒸至上气，焖 1 / 2 小时，取出，干燥。

## 红豆蔻

### 【来源】

本品为姜科植物大高良姜 *Alpinia galanga* Willd.的干燥成熟果实。

### 【炮制方法】

- 一、净制 除去杂质。
- 二、切制 用时捣碎。
- 三、炮炙 炒制 微妙。

## 葫芦

### 【来源】

本品为葫芦科植物葫芦 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.var.*depressa* (Ser.) Hara 的干燥近成熟果皮。

### 【炮制方法】

- 一、净制 洗净。除去果柄及种子。
- 二、切制 打碎。切块。

## 花椒

### 【来源】

本品为芸香科植物青椒 *Zanthoxylum schinifolium* Sieb.etZucc.或花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim.的干燥成熟果皮。

### 【炮制方法】

- 一、净制 除去椒目、果柄等杂质。

## 二、炮炙

1.炒制 取净花椒置锅内，用文火炒至有香气，取出，放凉。

2.醋制 取花椒用微火炒热，陆续淋醋，炒至醋尽，迅速出锅焖 1 小时，使其发汗，晒干。每花椒 1kg，用黄醋 120g。

3.盐制 取花椒用微火炒至有响声，喷淋盐水炒干。

## 化橘红

### 【来源】

本品为芸香科植物橘化州柚 *Citrus grandis* 'Tomentosa' 或柚 *Citrus grandis* (L.) Osbeck 的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。

### 【炮制方法】

一、净制 除去杂质。

二、切制 切碎。

三、炮炙

1.炒制 取生橘红，炒至具焦斑。

2.蜜制 取蜂蜜文火炼老，兑水适量，再将橘红碎块倒入，拌匀，待炒成微黄色时，出锅，摊开，晾凉。每橘红 100kg，用蜂蜜 18.75kg。

## 槐角

### 【来源】

本品为豆科植物槐 *Sophora japonica* L. 干燥成熟果实。

**【炮制方法】**

一、净制 除去杂质。

二、炮炙

1.蜜制 取净槐角，先将炼蜜加适量开水稀释后，加入净槐角中拌匀，焖透。置锅内用文火炒至外皮光亮，不粘手。每槐角 100kg，用炼蜜 5kg。

2.制炭 取净槐角，置锅内，用武火炒至表面焦黑色，内部深黄色。

3.蒸制 取槐角，拣去杂质，清水洗净，略润，移置笼或罐内，隔水加热，蒸至黑褐色为度，取出，晒干。

4.炒炙 取槐角，拣去枝梗，放入烧热的铁锅中，炒至膨胀发泡，取出，簸净。

## 火麻仁

**【来源】**

本品为桑科植物大麻 *Cannabis sativa* L.的干燥成熟果实。

**【炮制方法】**

一、净制 除去杂质。

二、炮炙 炒制 取净火麻仁，置锅内用文火炒至微黄色，有香气，取出，放凉。

## 急性子

**【来源】**

本品为凤仙花科植物凤仙花 *Impatiens balsamina* L.的干燥成熟种子。

**【炮制方法】**

一、净制 簸净杂质，用水洗净，晒干即得。取原药材，除去果皮及杂质。

二、炮炙 炒制 取净急性子，按炒黄法用文火微炒，取出，放凉。

**蒺藜****【来源】**

本品为蒺藜科植物蒺藜 *Tribulus terrestris* L.的干燥成熟果实。

**【炮制方法】**

一、净制 除去杂质。除去硬刺及杂质。

二、炮炙

1.炒制 取蒺藜置锅内，用火炒至微黄色，取出，放凉。

2.盐炙

（1）取除去刺的蒺藜，用盐水拌匀或喷洒均匀，稍焖，置锅内用文火炒至微黄色，取出，放凉。每蒺藜100kg，用食盐2kg。

（2）取原药材，拣净杂质，去净泥沙，晒干，研去刺，簸净皮屑，置热锅内不断翻动，取盐水喷洒均匀，用文火炒至微黄色，取出晾凉，入库即得。每白蒺藜100kg，用盐3kg加凉水12kg化开，澄清，取上清液。

3.麸制 先将锅烧热，撒入麦麸，至冒烟时，加入已去刺的蒺藜炒至金黄色，筛去麦麸即可。