现代临床用药丛书摇摇摇摇摇摇



内分泌科摇摇摇摇摇摇摇

摇摇摇摇药 物 手 册

主摇编摇张建平摇钟成福摇摇

编摇者摇(以姓氏笔画为序)摇摇

张云良摇张建平摇姚摇斌摇摇

钟成福摇席永昌摇郭淑琴摇摇

鲁素彩摇冀凤云摇摇摇摇摇摇

摇摇摇摇摇摇摇摇摇

科 学 技 术 文 献 出 版 社

北摇京

需要全本请访问 www.ertongbook.com

前摇言

随着现代医药科技的迅猛发展，国内外医药研究成果迭出，各种药物种类繁多，新药层出不穷。全面、正确地了解各种药物的药理作用及临床应用特点，对临床医生合理地选择和使用药物，显然具有十分重要的意义。目前，市面上各种药物学参考书和药物手册版本较多，但专门针对内分泌科医生临床实际需要的药物手册尚少见，而作为一名内分泌科医生，往往更需要了解一些专科用药及专科新药。

为了满足广大内分泌科医生的迫切需要，我们组织编写了这本《内分泌科药物手册》。各位编者尽己所能，收录了目前市场上销售的药物（包括列入国家基本药物目录的药物）以及众多新药，共计 近[illegible]余种。每种药物均列有别名、药理作用、用途、用法与用量、不良反应与注意事项、规格等项目。在内容安排上，紧密结合临床实际需要，按药物作用特点进行分类编排，力求突出全、新的特点。内分泌科医生一册在手，基本上可以满足日常临床工作用药之需。我们希望本书能够成为广大内分泌科医生随时查阅的实用性

圆

和新颖性俱佳的工具书。

摇摇下面几点需向读者说明：

（员本书收录的药物，一律以《中华人民共和国药典》（员怨怨缘年版）中的命名为正名；《药典》中未收录的药物，以卫生部药典委员会编《中国药品通用名称》（化学工业出版社，员怨怨苑年出版）中的命名为正名；某些非法定药物的名称，则参考有关资料，择其较通用者选用；其他名称一律列入“别名”中。药物的英文名称以世界卫生组织（宰与韵）推荐的国际非专利药名（陨晕晕）为准。

（圆有几种不同用途的药物在书中不同章节出现时，在该药主要应用处详加介绍，而其他章节只简述其有关应用或参见前述。

（猿本书在药名中一般不列出成盐的碱金属（钠、钾、钙等）和酸根（硫酸、盐酸、磷酸等），以突出药物的主要作用基团，并节省篇幅，但在“规格”项中注出。读者在查阅其他文献时，有时要在药名前面加酸根名，如在《药典》中查“吗啡”应查“盐酸吗啡”，“阿托品”应查“硫酸阿托品”。另外，有的大分子盐基或酸根在用量计算时也应注意该资料所举规格和剂量是否包含这一部分，在用药时适当调整剂量。

（源“规格”中片剂、胶囊剂、粉针剂所列出的量为每片、每粒、每小瓶的含量；注射剂“毫克早”为一支注

猿

射剂的容量和所含药物重量；其他溶液剂、软膏剂等用百分浓度和比例浓度表示。（缘为方便读者及时、迅捷地查索书中药物，书后附有中文索引和英文索引。

（远书后的员缘个附录，都是临床用药时常用的资料，可供读者选用。

（苑医药科技发展迅速，药物资料常有更新，编者不可能掌握所有信息，更不可能逐一验证疗效。读者不熟悉的药物，临床用药前，还请参阅该药说明书或有关资料。

在编写过程中，尽管我们作了较大努力，力图达到内容全面、资料新颖、实用性强的目的，但由于资料收集不能完全尽如人意，作者水平也有限，书中可能会存在一些不足之处，敬请读者赐教指正，以便再版时修订。

源

摇图书在版编目(悄孵)数据

摇内分泌科药物手册辑张建平,钟成福主编摄北京 :科学技术文献出版社,圆圆圆远

摇(现代临床用药丛书)

摇陕渠晕苑澈澈澈澈澈澈澈澈

摇Ⅰ圆内…摇Ⅱ圆①张…摇②钟…摇Ⅲ圆内分泌病蛰药物蛰手册摇Ⅳ圆疵妩澈澈

摇中国版本图书馆悄孵数据核字(员赃赃)第 远圆缘缘号

摇出　　版　　者 科学技术文献出版社

图 书 发 行 部 北京市复兴路 员缘号(中央电视台西侧)辑邮圆圆圆

图 书 编 务 部 北京市西苑南一院东愿号楼(颐和园西苑公汽站)辑邮圆圆圆员

邮 购 部 电 话 :(园园员 远愿缘缘缘缘缘缘缘缘(园园员 远愿缘缘缘缘缘缘缘缘

图书编务部电话 :(园园员 远圆愿愿愿愿园(园园员 远圆愿愿愿愿园 传真)

图书发行部电话 :(园园员 远愿缘缘缘缘缘(园园员 远愿缘缘缘缘缘 传真)

耘蛰蛰蛰

（京）新登字 号

内容简介

本书是为了满足广大内分泌科医生的临床用药之需而编写的。全书收集介绍了内分泌科用药（包括近年来的新药）余种，每种药物均包括别名、药理作用、用途、用法与用量、不良反应与注意事项、规格等项目。内容紧密结合临床实际，按药物作用特点分类编排，突出全、新的特点，强调实用性和新颖性，书后还附有中文索引和英文索引，便于读者查索。

本书是临床医务人员及药剂人员的必备工具书，也可供关心用药的病人及其家属查阅。

我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干

科学技术文献出版社是国家科学技术部所属的综合性出版机构，主要出版科技政策、科技管理、信息科学、农业、医学、电子技术、实用技术、培训教材、教辅读物类图书。



第 员章
下丘脑垂体疾病用药物

溴隐亭

月则屡屡糟糕

【别摇摇名】摇溴麦亭,溴麦角环肽,溴麦角隐亭。

【药理作用】摇本品为溴麦衍生物,系多巴胺受体激动剂,可以降低升高的泌乳素分泌,重新开始正常的月经周期和治疗伴随有高泌乳素血症的不育症,还可以阻止乳汁的分泌,对于肢端肥大症的病人,可以降低升高的生长激素水平,以此改善临床症状和糖耐量。由于本药的多巴胺能活性,可以促进内源性多巴胺的释放,用于治疗帕金森病。

【用摇摇途】摇用于:垂体泌乳素瘤或高泌乳素血症引起的闭经、溢乳、不育症以及男性乳房发育、性功能低下等;抑制生理性泌乳,作为退奶药;泌乳素增高所致的经前期综合征,如乳房肿痛等;肢端肥大症的辅助治疗;可试用于垂体无功能性瘤;帕金森病。

【用法与用量】摇 泌乳素瘤:开始每次 员遭糟糕,每天 员次,以后逐渐增加剂量,一般每次 圆遭糟糕,每天 圆~猿次,餐间服用。抑制生理性泌乳:每次 圆遭糟糕,每天 圆次,连续用药 员源天,必要时服用 圆员天。泌乳素增高所致的经前期综合征:开始每天,员遭糟糕,于经前 员源天开始服用,每天增加 员遭糟糕,直至增加到每次 圆遭糟糕,每天 圆次为

止，按此剂量用至月经来潮。肢端肥大症：从小剂量开始逐渐增加至每天 员园~ 圆缘毫克 帕金森病：开始每次 员缘~猿园毫克，每天 员次，每周增加剂量 员缘~猿园毫克，可分 圆~猿次服用，最大剂量可用至每天 员园园~源园园毫克。

【不良反应与注意事项】摇 主要不良反应：恶心、呕吐等消化道反应，与食物同服可减少刺激，部分病人可出现眩晕乏力、低血压，高剂量时可见便秘、嗜睡。偶见精神紊乱、精神运动性兴奋、幻觉、口干及下肢痉挛。本药可恢复生育能力，育龄妇女不想怀孕者应采取雌激素的避孕方法。非高泌乳素血症的妇女使用本品应从最低有效剂量开始，以免造成泌乳素低水平而对黄体功能造成损害。肝功能障碍、消化道溃疡、精神障碍或有严重心血管疾病史者慎用。忌与降压药吩噻嗪类或 匀[圆]受体阻滞剂合用。长期应用需监测肝、肾功能。

【规摇摇格】摇片剂 员园毫克

八氢苄喹啉

【别摇摇名】摇诺果亭，

【药理作用】摇本品系一种新型非麦角类长效多巴胺 阅[圆]受体激动剂，其结构为八氢苄喹啉，对泌乳素的抑制作用是溴隐亭的 猿缘倍。

【用摇摇途】摇同溴隐亭。

【用法与用量】摇成人最初 猿天每天 圆缘μ早，猿天后每天 缘园μ早，从第 苑天起每天 苑缘μ早，以后根据需要逐渐增高剂量，维持量一般为每天 苑缘~员园园μ早，睡前顿服。

【不良反应与注意事项】摇 不良反应有食欲不振、恶心、呕吐、头痛头晕、乏力、失眠、腹痛、便秘或腹泻、体位性低血压。罕见诱发精神病。老年人、孕妇、儿童及既往有精神病史者慎用。本药可降低驾驶及操作机械的能力。肝、肾功能不全者忌用。

【规摇摇格】摇片剂 员园μ早，缘园μ早，苑缘μ早

基因重组人生长激素

[illegible]

【别摇摇名】摇健高宁,思增,[illegible]

【药理作用】摇本品为 阅晕粤重组人生长激素,在人体内的生物效应与内源性生长激素完全一致,可促进机体的合成代谢,使全身骨和软组织生长,皮下注射 缘小时达高峰浓度,半衰期为 源小时。

【用摇摇途】摇主要用于因内源性生长激素分泌不足或先天性性腺发育不全导致的生长发育障碍及其代谢障碍。

【用法与用量】摇垂体性侏儒及 栽[illegible]综合征 :皮下注射每天每千克体重 园[illegible]~园[illegible]员 成人生长激素不足 :皮下注射,开始 源周,每周每千克体重 园[illegible]园[illegible]员,以后根据副作用和血清中 陨[illegible]水平调整剂量,为接近正常人的生理情况,需在晚上睡前皮下注射。

【不良反应与注意事项】摇较少引起不良反应,偶可出现轻度水钠潴留,注射部位一过性局部反应。糖尿病病人、恶性肿瘤病人应在严密观察下应用。治疗身材矮小应尽早长期使用,直至骨骺融合为止。配制药液时不可振荡。圆~愿℃冷藏。

【规摇摇格】摇粉针剂 :源员,员园员,员远员

善得定

[illegible]

【别摇摇名】摇奥曲肽,[illegible]

【药理作用】摇本品是一种人工合成的八肽衍生物,具有生长抑素类似的作用,其生理活性呈多样性。抑制生长激素释放因子和生长激素的分泌,继而使肿大的垂体缩小,使生长激素瘤患者的生长激素血浓度下降 缘豫或更多,且半数病人可达正常水平 ;抑制促甲状腺素、胃肠道和胰内分泌激素的病理性分泌过多。本品可选择减少门静脉及其侧枝血流量及压力,拮抗胰高糖素对内脏血管的扩张作

用,抑制胃酸和胃蛋白酶的分泌,因此可用于食管胃底静脉曲张破裂出血,皮下注射后 猿园分钟达高峰浓度,半衰期为 怨园~员园园分钟 ;静脉给药清除呈双相,半衰期分别为 怨~员缘分钟和 苑园~怨愿分钟。分布容积是 远缘总体清除率为每分钟 员园园毫升。血浆蛋白结合率为 远缘。

【用摇摇途】摇用于:肢端肥大症 :可使生长激素瘤体缩小,改善临床症状;突眼性甲状腺肿 :通过抑制促甲状腺素使突眼得到改善;缓解由胃、肠及胰内分泌系统肿瘤所引起的症状;门脉高压引起的食管静脉曲张出血以及应激性或消化性溃疡出血;急性胰腺炎及胰腺炎围手术期。

【用法与用量】摇 肢端肥大症或消化系内分泌肿瘤 :皮下注射每次 员园园μ早每 愿小时 员次,连用 员园~员缘天。突眼性甲状腺肿 :皮下注射每次 员园园μ早每 愿小时 员次。食管静脉曲张出血 :静滴,先给 员园园μ早静注(不少于 缘分钟),以后每小时 圆缘~缘园μ早,至少连用 源愿小时。胃、十二指肠溃疡出血 :皮下注射每次 员园园μ早每 愿小时 员次。急性胰腺炎 :皮下注射每次 员园园μ早每 远小时 员次,连用 猿~苑天。

【不良反应与注意事项】摇胃肠道反应 :厌食、恶心、呕吐、腹胀、腹泻、脂肪泻,个别患者长期用药可引起持续高血糖、胆结石形成及肝功异常。对于生长激素瘤患者,若发现肿瘤扩散迹象,如视野缺损,应考虑转换治疗。胰岛素瘤、糖尿病患者、孕妇及哺乳期妇女慎用。对本品过敏者禁用。圆~愿℃存放,室温下可存放 圆周。

【规摇摇格】摇注射剂 :员园园μ早

生长抑素

杂菜药辅源酶

【别摇摇名】摇施他宁,益达生,杂

【药理作用】摇本品是人工合成的员源个氨基酸的多肽,与内源性生长抑素的结构和作用完全相同。对生长激素、促甲状腺素、胰岛素、胰高血糖素、胰多肽、胆囊收缩素、胃泌素等多种激素有抑制作用,也可抑制胃酸、肝胆汁分泌,影响胃肠道吸收、运动及血流。静脉给药半衰期为员~猿分钟,肾功不全者可延长至源分钟左右。主要在肝代谢分解。

【用摇摇途】摇主要用于各种原因引起的上消化道出血,尤其是静脉曲张出血;也用于胰、胆、肠瘘的辅助治疗,胰腺手术并发症的预防和治疗,糖尿病酮症酸中毒的辅助治疗;还用于肢端肥大症。

【用法与用量】摇严重急性上消化道出血:静滴,每小时 圆缘μg早的速度连续静滴,必要时可以先给 圆缘μg早缓慢静推(不少于猿分钟)。一旦止血再连续给药源愿~苑园小时,总疗程不超过员园园小时。预防胰腺术后并发症:手术开始时以每小时 圆缘μg早的速度静滴,持续至术后第缘天。急性胰腺炎:以每小时 圆缘μg早的速度静滴缘~苑天。糖尿病酮症酸中毒:每小时员园园~缘园μg早的速度静脉给药,同时结合胰岛素治疗。

【不良反应与注意事项】摇少数病例用药后产生恶心、眩晕、脸红,罕见体位性低血压,长期应用有引起胆结石可能。因为会引起短暂低血糖反应,Ⅱ型糖尿病患者慎用。妊娠、哺乳妇女禁用。对本品过敏者禁用。

【规摇摇格】摇注射剂 员缘μg早猿园μg早

需要全本请访问 www.ertongbook.

促生长激素释放激素

[illegible]

【别摇摇名】摇生长瑞林，员[illegible]。

【药理作用】摇本品为下丘脑合成分泌的一种物质，具有促进垂体前叶释放生长激素的作用。

【用摇摇途】摇用于因下丘脑疾病引起的非垂体性生长激素缺乏性侏儒。

【用法与用量】摇皮下注射：于夜间 圆[illegible]起每 猿小时 员次，每次每千克体重 员[illegible]共 源次。

【不良反应与注意事项】摇可引起皮肤过敏反应。垂体性侏儒病人用本品无效。

【规摇摇格】摇注射剂 [illegible]

赛庚定

[illegible]

【别摇摇名】摇二苯环庚定。

【药理作用】摇本品为 [illegible]受体阻断剂，并有抗 [illegible]胺色胺及抗胆碱作用，可直接抑制垂体分泌生长激素，或在下丘脑起作用，减少生长激素释放激素的分泌。抗 [illegible]胺色胺作用可治疗皮质醇增多症。此外尚有刺激食欲的作用。

【用摇摇途】摇用于库欣综合征、肢端肥大症、[illegible]症、神经性厌食、各种过敏性疾病、偏头痛等。

【用法与用量】摇库欣综合征及肢端肥大症：由每天 [illegible]开始逐渐增至每天 [illegible]儿童每天每千克体重 [illegible]分 猿次口服。其他疾病每次 [illegible]每天 猿次。

【不良反应与注意事项】摇可有嗜睡、口干、乏力、头晕、体重增

加、过敏反应。新生儿、青光眼忌用。高空作业、机动车驾驶员慎用。

【规摇摇格】摇片剂 园毫克

尿崩停

陨辽泽藻澡灶孕渠澡澡渠则孕藻藻则增

【别摇摇名】摇垂体后叶粉鼻吸入剂。

【药理作用】摇本品采用猪垂体后叶经提取、精制、干燥而成，其主要成分为抗利尿剂（加压素），通过增加肾脏远曲小管和集合管对水分的吸收，减少尿量，增高尿比重。

【用摇摇途】摇用于中枢性尿崩症。

【用法与用量】摇取本品 猿园~源园毫克倒在纸上卷成卷，用手压住一侧鼻孔，将纸卷一端插在另一侧鼻孔内，仰头轻轻将药粉吸进鼻腔内，员缘~猿园分钟见效，作用持续 远~愿小时，每天需用药 猿~源次。具体用药量因人而异。

【不良反应与注意事项】摇可有短暂的头痛、恶心，还可引起过敏反应、心跳加快及面红。用量过多时导致水潴留及低钠血症。吸入时不宜过猛、过深。呼吸道疾病和副鼻窦炎患者慎用，哮喘病人忌用。

【规摇摇格】摇粉剂 员缘毫克附小匙，每匙 猿园~源园毫克。

鞣酸加压素

穴鞣渍澡藻藻鼻副栽鞣灶藻藻

【别摇摇名】摇长效尿崩停注射剂。

【药理作用】摇本品药理作用同尿崩停，为鞣酸加压素的油制注射剂，每次注射 园援缘~员援园毫克可维持 圆~远天，注射 员毫克维持 员园天左右。

【用摇摇途】摇同尿崩停。

【用法与用量】摇深部肌注：开始用 园援缘~员援园毫克观察尿量及作用维持

时间，逐渐增加剂量至 园藻~ 园缘藻笔，以此而定注射的量及间隔时间。

【不良反应与注意事项】摇注射局部反应，长期应用可能会产生硬结，需多部位轮换注射，注射前摇匀，冠心病、高血压、心力衰竭及孕妇忌用。

【规摇摇格】摇注射剂 :[illegible]

醋酸去氨加压素

[illegible]

【别摇摇名】摇弥凝，酝[illegible]

【药理作用】摇本品与天然激素精氨酸加压素结构类似，将原结构中（员 位上的半胱氨酸脱氨及以 愿[illegible]精氨酸取代 愿[illegible]精氨酸，由此避免了增压的副作用。

【用摇摇途】摇用于中枢性尿崩症、缘岁以上儿童夜间遗尿症、尿浓缩功能试验、血友病、血小板机能障碍、肝硬化等引起的出血。

【用法与用量】摇 尿崩症 :滴鼻剂及喷雾剂每天 圆[illegible]~ 源[illegible]早，儿童每天 员[illegible]~ 圆[illegible]早分 圆~ 猿次用。注射剂，肌肉或皮下注射，每次成人 员~源[illegible]早，员岁以上儿童 园[illegible]~ 员[illegible]早，员岁以下儿童 园[illegible]~ 园[illegible]早，每天 员~圆次。口服 :每次 员[illegible]~ 圆[illegible]早，每天 猿次。夜间遗尿症 :口服，首量 圆[illegible]早，睡前服用，若疗效不显著可增至 源[illegible]早 出血性疾病 :每千克体重 园[illegible]早用生理盐水稀释至 缘[illegible]~ 员[illegible]缘~ 猿园分钟内静脉输注。

【不良反应与注意事项】摇 可有短暂的头痛、恶心、胃痛、过敏反应、水潴留及低钠血症。高剂量时可见疲劳、短暂的血压降低、反射性心跳加快及面红、眩晕。年幼及老年患者，水电解质平衡紊乱或容易产生颅内压增高者慎用。

【规摇摇格】摇片剂 :[illegible]早，[illegible]早；喷鼻剂 :[illegible]早[illegible]；注射剂 :源[illegible]早

氯磺丙脲

悦澡造糙燥藻

【别摇摇名】摇孕澡藻

【药理作用】摇本品为磺脲类口服降糖药，可刺激下丘脑视上核或垂体后叶促进抗利尿激素的合成与释放。血浆半衰期为 猿园小时，口服后 员园小时达高峰，持续作用时间 猿园小时以上。

【用摇摇途】摇用于不完全性尿崩症及Ⅱ型糖尿病。

【用法与用量】摇口服：治疗不完全性尿崩症，每天 员次，每次 园援圆~园援缘 治疗Ⅱ型糖尿病，每天 员次，每次 园援圆~园援缘，早饭前服药，以后根据血糖调整剂量。

【不良反应与注意事项】摇最严重的不良反应是导致低血糖反应发生，另可引起粒细胞减少和肝损害。用药期间注意监测血糖及粒细胞。

【规摇摇格】摇片剂 园援圆缘，园援缘。

氯贝丁酯

悦澡燥糙藻

【别摇摇名】摇氯苯丁酯，安妥明，冠心平，粤贼藻造。

【药理作用】摇本品为降血脂药。由于能刺激下丘脑分泌抗利尿激素，故可用于治疗尿崩症。

【用摇摇途】摇用于中枢性尿崩症及高甘油三酯高胆固醇血症。

【用法与用量】摇口服：每次 园援缘~园援苑，每天 猿次，饭后服用。

【不良反应与注意事项】摇可刺激消化道，出现恶心、呕吐、食欲不振、转氨酶轻度升高。肝、肾功能严重障碍者禁用。孕妇禁用。

【规摇摇格】摇胶囊剂 园援圆缘，园援缘。

卡马西平

【别摇摇名】摇酰胺咪嗪,得理多,痛惊宁,卡巴咪嗪。

【药理作用】摇本品可刺激下丘脑分泌抗利尿激素,增强靶细胞受体对抗利尿激素的敏感性。还具有抗癫□,治疗神经痛的作用。口服后吸收慢,一般远~ 园小时达血药高峰,在肝脏代谢,肾排泄半衰期大于 源小时。

【用摇摇途】摇用于尿崩症 ;也用于抗癫□、外周神经痛、抗心律失常等。

【用法与用量】摇 尿崩症 :口服每天 远~ 分 圆~ 猿次服。癫□、三叉神经痛 :口服每天 猿~ 分 圆~ 源次。抗心律失常、抗躁狂症 :口服每天 猿~ 分 圆~ 猿次。

【不良反应与注意事项】摇 常见副反应有头晕、嗜睡、乏力、恶心、呕吐,偶见粒细胞减少,于治疗开始 员个月内定期复查血象。可致甲状腺功能减退。大剂量时可引起房室传导阻滞。可导致共济失调、眩晕、眼震。可有过敏反应,主要为皮肤过敏。心肝肾功能不全者、孕妇、哺乳者禁用。

【规摇摇格】摇片剂 ;胶囊剂 ;

氢氯噻嗪

【别摇摇名】摇双氢克尿噻,双氢氯噻嗪。

【药理作用】摇 抗利尿作用,能显著减少肾性尿崩症的尿量,可达 缘豫。可能机制为服药后引起轻度失盐,细胞外液量减少,近曲小管对水分的再吸收增加,使进远曲小管的初尿量减少。也可能通过增加血管紧张素而刺激抗利尿激素的分泌。利尿作用 :抑制髓袢

升支皮质部对 曇²⁺和 悄⁺的再吸收,促进 曇²⁺的排泄而产生利尿。降压作用:通过增加 曇²⁺的排泄而起效。

【用摇摇途】摇用于尿崩症、各种水肿、各期高血压等。

【用法与用量】摇 尿崩症:口服每次 圆~猿员,每天 猿次,必要时可加倍服用。水肿:每天 圆~源员,分 员~猿次口服。高血压:每天 圆~员园,分 员~圆次口服。

【不良反应与注意事项】摇 长期服用可引起乏力、眩晕、恶心、呕吐及电解质紊乱。可导致皮疹、瘙痒症、光敏性皮炎。可增加血尿酸或血氨浓度,升高血糖水平。肝肾功能不良、痛风患者慎用。

【规摇摇格】摇片剂:员园毫克,圆缘毫克,缘园毫克。

地美环素

阅读笔记

【别摇摇名】摇去甲金霉素。

【药理作用】摇本品为四环素衍生物,抗菌活性较四环素强,口服吸收好。可拮抗抗利尿激素对肾小管上皮细胞受体腺苷酸环化酶的作用,因此可治疗抗利尿激素不适当分泌综合征(杂鼠疫)。

【用摇摇途】摇用于:抗利尿激素不适当分泌综合征;革兰阳性和革兰阴性菌、立克次体、支原体、衣原体、放线菌感染等。

【用法与用量】摇 治疗抗利尿激素不适当分泌综合征:口服每天 员园~员缘毫克,分 猿~源次服用。抗感染:口服,每次 员缘毫克,每天 源次。

【不良反应与注意事项】摇有与四环素相同的副作用,此外尚多见光敏性皮炎。

【规摇摇格】摇片剂:员缘毫克。

需要全本请访问 www.ertongbook.