

中华医学全集

新药应用宝典 (三)

王宝勤 主编

中华医学电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

**中华医学全集/王宝勤主编.—北京: 中华医学
电子音像出版社, 2004**

ISBN 7-900106-23-5

I.中… II.王… III.医药学—文集—汇编

IV.R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117529 号

中华医学电子音像出版社出版发行

(北京市东城区东四西大街 42 号 100710)

全国各地新华书店经销 北京双青印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

版号: ISBN 7-900106-23-5/R·01

定价: 6998.00 元(1CD,含配套书)

妇产科用药

目 录

◎蒂洛安.....	1
◎普拉睾酮.....	4
◎地诺前列酮.....	6
◎蕾佛奴尔.....	8
◎麦角新碱.....	9
◎缩宫素注射液.....	11
◎利托君.....	12
◎甲麦角林.....	14
◎奥平.....	17
◎倍美力片.....	18
◎倍美力阴道软.....	20
◎补佳乐.....	22
◎达克宁栓.....	25
◎达那唑栓.....	27
◎肤特灵.....	29
◎孚康栓剂.....	30
◎孚舒达.....	32

◎妇乐冲剂.....	34
◎复方蛇脂软膏.....	35
◎复皆舒.....	36
◎金妇康.....	37
◎金刚藤胶囊.....	38
◎凯妮汀.....	39
◎康妇特栓.....	41
◎康复特栓.....	44
◎克林.....	45
◎坤宝丸.....	49
◎坤宁口服液.....	51
◎丽人圣洁.....	52
◎皮宝霜.....	54
◎圣洁洗液.....	56
◎双唑泰泡腾片.....	57
◎修正妇康片.....	60
◎阴康宁.....	63
◎止血宝胶囊.....	64
◎999 芙泰复方苯甲酸酊.....	66
◎阿维 A 胶囊.....	66
◎艾迪特.....	67
◎艾洛松.....	69

◎疤痕美.....	70
◎百多邦.....	71
◎贝肤漫.....	73
◎采乐.....	74
◎痤疮王.....	76
◎达芙文凝胶.....	77
◎达克宁霜.....	79
◎达英-35.....	81
◎迪银片.....	84
◎丁克.....	85
◎肤特灵.....	88
◎孚琪.....	89
◎孚琪溶液.....	90
◎孚琪乳膏.....	92
◎氟康唑片.....	94
◎复方康纳乐霜.....	100
◎复方青黛胶囊.....	102
◎复方蛇脂软膏.....	103
◎环利软膏.....	104
◎康瑞保.....	107
◎克林.....	108
◎克疣王.....	112

◎来可得脂霜.....	114
◎丽人圣洁.....	116
◎疗霉舒霜剂.....	118
◎罗可坦.....	120
◎美克.....	124
◎耐瑞霜剂.....	126
◎派瑞松霜.....	128
◎喷脚灵.....	130
◎皮宝霜.....	131
◎皮灵洗剂、皮灵霜.....	132
◎皮清霜.....	133
◎圣洁洗液.....	134
◎斯皮仁诺.....	135
◎泰尔丝.....	138
◎酞丁安搽剂.....	140
◎维阿露.....	142
◎维特明.....	143
◎希尔生.....	146
◎显克欣.....	148
◎新体卡松.....	151
◎尤卓尔.....	153
◎泽它.....	155

◎阿昔洛韦滴眼液.....	157
◎艾氟龙.....	158
◎白内停.....	160
◎百力特.....	161
◎贝复舒.....	164
◎倍他洛尔.....	167
◎典必殊.....	168
◎拂雷.....	170
◎复方托品酰胺滴眼剂.....	172
◎海诺特-粘弹性保护剂.....	173
◎环丙沙星滴眼液.....	175
◎卡林-U 滴眼液.....	176
◎乐免敏滴眼液.....	178
◎泪然.....	182
◎马来酸噻吗洛尔滴眼液.....	184
◎美开朗滴眼液.....	187
◎润洁.....	190
◎润舒滴眼液.....	192
◎三氮唑核苷滴眼液.....	193
◎色甘酸钠滴眼液.....	194
◎素高捷疗眼膏.....	195
◎酞丁安滴眼液.....	198

◎托百士滴眼液/眼药膏	199
◎潇莱威.....	201
◎怡然.....	203
◎珍珠明目眼液.....	204
◎鼻窦炎口服液.....	204
◎伯克纳.....	206
◎鼾静香薰止鼾漱口液.....	207
◎华素片.....	208
◎金参润喉合剂.....	211
◎雷诺考特喷鼻水剂.....	213
◎立复汀 鼻喷剂.....	214
◎泰利必妥滴耳液.....	216
◎西瓜霜 润喉片.....	217
◎信可舒.....	218
◎银黄含片.....	219

◎ 蒂洛安

药剂名称：蒂洛安

别名：

**注射用硫酸普拉酮钠； PRASTERONE
SODIUM SULFATE FOR INJECTION； 3-â 羟基-雄
甾-5-烯-17-酮-3 硫酸酯钠**

理化特性：

性状：本品为白色冻干块状物或粉末。

药理作用：

本品为人体肾上腺分泌的内源性甾体激素。能促进子宫颈管成熟(宫颈软化、宫颈消退、宫口开大)，直接作用于子宫颈管，无子宫收缩作用。

- 1.能使孕大鼠宫颈含水量及重量增加，从而使宫颈软化。**
- 2.能使孕大鼠宫颈的肌张力减弱，有助于宫口开大。**

3.能使孕兔宫颈胶原酶活性增强，从而引起胶原纤维分解，胶原束间隙扩大，结缔组织疏松，增加宫颈的伸展性，促进宫颈成熟。

吸收、分布、排泄：

妊娠晚期孕妇静注本品200mg，5分钟后血中药物浓度，为给药前生理浓度的50倍，继之可见宫颈内药物含量的明显升高，半衰期为2小时。药物代谢部位以胎盘为主，可转化为雌激素和17-酮基甾体后在24小时内由尿中排出。

作用和用途：用于妊娠晚期子宫颈管成熟不全。

用法和用量：

每次用本品100mg~200mg溶于5%葡萄糖注射液或注射用水中(使浓度为10mg/ml)，静脉推注，每日一次，共三日。

贮藏：遮光、密闭保存，有效期二年。

不良反应和注意：

不良反应：

偶见口干恶心、呕吐、眩晕、行走乏力、胸闷、阴道分泌物增多、手指麻木或注射部位疼痛等轻度一过性反应。

注意事项：

- 1.心、肝、肾功能不全产妇慎用。
- 2.本品为子宫颈管成熟促进剂，应在给引产药物（如前列腺素、催产素等）之前使用。
- 3.对于胎儿发育迟缓或无力经阴道分娩的产妇应慎用。
- 4.本品可用注射用水溶解，但不宜用生理盐水溶解。
- 5.本品在溶液状态不稳定，故溶解后应尽快使用。
- 6.静脉注射时推药速度宜缓慢，应在一分钟以上。

剂型与包装：100mg/瓶。

厂商：丽珠集团丽宝生物化学制药有限公司

批准文号：(96)卫药准字X-160-3号

◎ 普拉睾酮

药剂名称：普拉睾酮

别名：普拉雄酮；去氧异雄甾酮；MYLIS；

Prasterone

理化特性：

常用其硫酸钠盐，为白色结晶或结晶性粉末，无臭，味苦。溶于水，水溶液的pH为5.5-8.0。

作用和用途：

为同化激素类药物。动物实验表明对妊娠子宫可使其子宫颈胶原酶活性增加，引起胶原纤维分解，胶原束间隙扩大，宫颈伸展性增加。它在体内可转化为雌激素，因此宫颈组织脱氢表雄甾酮及雌激素含量增加。引起血管扩张、通透性增加，含水量增加，间质浮肿，使颈管软化。雌激素增加还可使基质成分或酸性粘多糖等增加，以上变化可导致颈管成熟，颈管变软，伸展性加强有利于分娩。对于子宫成熟不全(子

宫口开大不全颈，管消退不全，颈管软化不会)有促进成熟作用。无子宫收缩作用。可减少产程延长及过期产。不影响乳汁分泌。可用于晚期子宫颈管成熟不全。

用法和用量：

对妊娠晚期的孕妇，将100mg溶于10ml的注射用水或5%葡萄糖注射液中缓慢静脉注射。1日1次，每次100-200mg，每周2-3次

不良反应和注意：

1.不能用氯化钠注射液溶解(可混浊)。低于20℃时难以溶解，可用低温(30℃-40℃)加温。溶液不稳定，应临用时配制，且于溶后尽快使用。

2.副作用有皮疹、恶心、呕吐、腹泻、眩晕、耳鸣、手指麻木、手浮肿等。

3.器官形成期的动物实验中发现有致胎仔死亡情况，故妊娠初期不宜使用。

剂型与包装：制剂：注射用普拉雄酮：每支100mg。

◎地诺前列酮

药剂名称：地诺前列酮

别名：前列腺素E₂； ProstaglandinE₂； PGE₂；
Dinoprostone

理化特性：为无色结晶。

作用和用途：

对各期妊娠子宫都有收缩用途，以妊娠晚期子宫最为敏感。可用于中期妊娠引产、足月妊娠引产和治疗性流产，对妊娠毒血症(先兆子痫、高血压)、妊娠合并心肾疾患者、过期妊娠、死胎不下、水泡状胎块、羊膜早破、高龄初产妇等均可应用。

用法和用量：

应用前，将前列腺素E₂和碳酸钠溶液各1支加入10ml生理盐水中，摇匀使成稀释液，供宫腔给药或静脉滴注给药。静滴：将上述含2mg前列腺素E₂的稀释液加入5%葡萄糖液500ml中滴注，一般滴速：中期妊

妊娠引产4-8g/分(15-30滴/分左右)；足月妊娠引产1g/分。宫腔内羊膜腔外给药；每次给药200g，2小时给药一次。给药3小时后，亦可酌情加用适量缩宫素，以加速产程进展。

不良反应和注意：

- 1.必须严密观察宫缩情况，随时调节用药剂量，以防止宫缩过强而发生子宫破裂。
- 2.静滴时，少数可出类似静脉炎症状，停药后常自行消失。
- 3.少数病例出现呕吐或轻度腹泻等。
- 4.既往有癫痫病史者应慎用。

剂型与包装：

制剂：注射液：为前列腺素E₂的无水乙醇灭菌溶液，每支2mg。另附每支1mg碳酸钠的溶液及10ml的生理盐水。

◎ 蕾佛奴尔

药剂名称：蕾佛奴尔

别名：BivanloIuIn

作用和用途：

用于中期妊娠引产。较安全、有效，成功率高。作用比天花粉快。无严重并发症，很少引起感染。注射后有阵缩疼痛及产后出血，适用于妊娠16-24周引产，一般用药后42小时左右产出，超过48小时胎儿、胎盘未产出者，需注射第2次，或改用其他方法。

用法和用量：

胎膜外注入：用于妊娠14-18周者，每次50mg、胎膜内注入，用于妊娠18-24周者，每次50-100mg临用前以灭菌注射用水配成0.1%溶液后注入。

不良反应和注意：

1.有肝、肾病者不宜应用，以免中毒。溶媒应用灭菌注射用水，不能使用灭菌生理盐水。以免发生沉