

儿科临床用药概述

儿科处方用药原则

1.

2.

3.

4.

合理用药的注意事项

1.

2

疾

3.

1.

2.

3.

4.

5.

□

6.

7.

呱 啞

3

8.

嘧啶

二

嗪

1.

=

2~3

每
×
生

2.

[kg $\times 0.035 + 0.1$; $> 30\text{kg}$ $\times 0.02 + 1.05$) $\times 0.02 + 1.05$) =

3

1。

年龄	剂量	年龄	剂量
初生至 1个月	成人剂量的 1/18~1/14	2~4岁	成人剂量的 1/4~1/3
1~6 个月	成人剂量的 1/14~1/7	4~6岁	成人剂量的 1/3~2/5
6个月 至1岁	成人剂量的 1/7~1/5	6~9岁	成人剂量的 2/5~1/2
1~2岁	成人剂量的 1/5~1/4	9~14岁	成人剂量的 1/2~2/3

4.

=

×

(kg) /50

儿

影响药物疗效的因素

pH

1.

2.

3.

24h

90%

10d

5%

4.

5.

6.

6

7.

选择正确的给药途径

1.

2.

3.

4.

给药次数和时间要适宜

1.

3

7

36~48h)

4~6h 1 2
 2

2.

24h

8~10

7

7

7

1

3.

8 1

3

1

4.

酰

5.

痛

慎用、禁用药物

1.

(1)

(2) 慎

K

(3)

蚤

2.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.

(1)

4~5

6-

草
草

· 皖

(2)

B₆

联合用药问题及配伍禁忌

1.

上

10

C

B₆

2

(1)

(2)

(3)

(4)

B

E

(5)

12

(6

(7)

$1/3 \sim 1/2$

(8

(9

3.

(1)

(2)

秘

鞣

(3)

合理选用抗生素

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(1)

B K

(2)

(3)

7.

1.

(1)

24h

β -

(2)

2.

II

14

3.

4.

5.

6. 母

杆

7.

8.

9.

塞

c

10.

11.

β^-

2.

V

3.

VI

β^-

1.

2.

3.

β^-

1.

2

8h

1

24h

3.

β^-

4.

β^-

β^-

$\bar{\nu}_e$

5.

2.5h₀

6

6.

4.5h